



UFES

2025 | ES | 50 Questões



Questão 1

UFES | ES | 2025

Assinale a alternativa correta:

- A)** A Leucemia Linfoblástica tem incidência maior com o aumento da idade.
- B)** A Leucemia Linfocítica Crônica é a leucemia mais prevalente, dentre as leucemias.
- C)** A Leucemia Mieloide Crônica tem no transplante alogênico a principal forma de tratamento.
- D)** A Leucemia Mielóide Aguda é o câncer mais comum nos adultos jovens.

Questão 2

UFES | ES | 2025

Uma paciente de 46 anos deu entrada no Pronto Socorro com história de cefaleia holocraniana de leve intensidade há duas semanas. Há uma semana, houve intensificação da cefaleia e surgimento de febre baixa diária. Ao exame, a paciente se encontrava febril, sonolenta e com rigidez de nuca leve. A tomografia computadorizada do crânio revelou discreto espessamento meníngeo. Em seguida, a paciente foi submetida à punção liquórica, sendo obtido líquido levemente turvo e xantocrômico, com pressão de abertura de 22 cm de água, 250 células/mm² (40% neutrófilos, 40% linfócitos e 20% monócitos), proteínas de 550 mg/dl e glicose de 10 mg/dl. Assinale a opção que contenha doenças que melhor justificam os achados liquóricos desta paciente.

- A)** Meningite viral e meningite fúngica.
- B)** Meningite viral e meningite bacteriana.
- C)** Meningite tuberculosa e meningite fúngica.
- D)** Meningite tuberculosa e meningoencefalite herpética.

Questão 3

UFES | ES | 2025

Uma jovem de 25 anos é trazida ao Pronto Socorro após ter sofrido colisão leve com um ciclista. O ciclista achou melhor levá-la ao hospital pois ela parecia agitada. No atendimento, a paciente disse que não conseguia dormir há 2 dias e vem apresentando, há 3 dias, ansiedade, inquietação e mialgia generalizada. Ao exame clínico, foram identificadas pupilas dilatadas, lacrimejamento, piloereção e sudorese. A condição mais provável que explicaria a condição da paciente seria a abstinência de qual das seguintes substâncias?

- A)** Cocaína.
- B)** Nicotina.
- C)** Opióides.
- D)** Álcool.

Questão 4

UFES | ES | 2025

Paciente feminina, 65 anos, diabética há 15 anos hipertensa há 10 anos é acompanhada na Unidade Básica de Saúde (UBS). Foi triada pelo agente comunitário para realizar alguns exames para avaliar se ela apresenta Doença Renal Crônica (DRC). Em relação à triagem da DRC na UBS, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas e em seguida assinale a alternativa que contem a sequência correta.

() Os exames que podem ser solicitados para definir a existência da doença renal crônica são creatinina, albuminúria ou relação albumina/creatinina em amostra de urina e a ultrassonografia do aparelho urinário.

() Os exames necessários para definir o estadiamento da DRC são ureia e creatinina.

() Os pacientes classificados como DRC Grau 3A - A1 devem sempre ser encaminhados a um especialista nefrologista.

() É de responsabilidade da Atenção Primária a realização de eventos de promoção e prevenção das doenças reais.

- A)** F - F - V - V
- B)** V - V - V - F
- C)** V - F - F - V
- D)** F - F - F - V

Questão 5

UFES | ES | 2025

Paciente de 67 anos, feminina, deu entrada em um serviço de emergência com dor torácica prolongada, hemodinamicamente estável, referindo três episódios nas últimas 12 horas. Pressão arterial de 100/60/mmHg e frequência cardíaca de 95 bpm. Referia antecedentes de hipertensão, tabagismo e diabetes. O eletrocardiograma de entrada mostrava infradesnívelamento do segmento ST de 2 mm. Iniciada nitroglicerina endovenosa com melhora completa da dor. O resultado do exame de troponina foi positivo e a paciente apresentava creatinina de 1,7 mg/dL. Diante desse quadro, qual o risco isquêmico e em quanto tempo idealmente ela deve ser submetida à cineangiocoronariografia?

- A)** Risco muito alto, < 2 horas.
- B)** Risco alto, < 24 horas.
- C)** Risco intermediário, entre 25 a 72 horas.
- D)** Risco Baixo. Realizar teste não invasivo antes de indicar a cineangiocoronariografia.

Questão 6

UFES | ES | 2025

Durante a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) de um paciente foi observado ritmo de fibrilação ventricular (FV). O paciente foi desfibrilado com carga máxima. Após isso, qual o próximo passo na sequência de reanimação?

- A)** Checar pulso.
 - B)** Avaliar ritmo.
 - C)** Proceder a intubação orotraqueal.
 - D)** Retornar as compressões imediatamente.
-

Questão 7

UFES | ES | 2025

Sobre o tabagismo, assinale a alternativa correta.

- A)** Em 1989, 34,8% da população brasileira era tabagista. Em 2019 esse percentual caiu para 12,6%.
- B)** O tabagismo está relacionado as seguintes cânceres: esôfago, pulmão, boca e tireoide.
- C)** A bupropiona é um antidepressivo que pode ser utilizado para auxiliar na cessação do tabagismo apenas nos casos em que o paciente apresentar transtorno depressivo.
- D)** A terapia de reposição de nicotina deve ser evitada já que mantém o paciente com vício de nicotina.

Questão 8

UFES | ES | 2025

Paciente 54 anos, tabagista, trabalhador rural, com quadro de dispneia, emagrecimento e tosse seca há 4 meses. Radiografia de tórax evidencia envolvimento pulmonar bilateral, para-hilar e simétrico, predomínio de lesões alveolares, poupando ápices e terços inferiores (imagem de "asa de borboleta"). Em relação ao caso, assinale a alternativa correta.

- A)** Dentre as hipóteses diagnósticas estão a paracoccidiodomicose que deve ser tratada com albendazol por 12 meses.
- B)** O diagnóstico pode ser feito através de exame de escarro com pesquisa de fungos e bacilo álcool ácido resistente.
- C)** O diagnóstico mais provável, considerando a descrição do exame de imagem, é tuberculose pulmonar e seu tratamento deve ser prontamente iniciado.
- D)** Em casos de paracoccidiodomicose o acometimento da supra renal é raro.

Questão 9

UFES | ES | 2025

Paciente masculino, 47 anos, vem apresentando há 2 meses dor epigástrica de forte intensidade com despertar noturno. Realizou endoscopia digestiva alta para investigação do quadro que evidenciou úlcera em parede anterior de bulbo duodenal de 2 cm de diâmetro, classificação endoscópica A1 de Sakita. Além da doença ulcerosa péptica, qual das opções abaixo é uma indicação para o tratamento do *Helicobacter pylori*?

- A)** Doença do refluxo gastroesofágico.
- B)** Leucemia mielóide crônica.
- C)** Púrpura trombocitopênica idiopática.
- D)** Uso de antagonista da Vitamina K.

Questão 10

UFES | ES | 2025

Paciente do sexo feminino com lesões maculares eritematosas em troco e membros, inclusive

palma das mãos e planta dos pés, iniciadas 45 dias após relação sexual desprotegida. VDRL 1/128. Recebeu há 1 dia Penicilina Benzatina 2,4 milhões de unidades desenvolvendo piora das lesões cutâneas, febre, cefaleia, mialgia e sudorese. Mantendo estabilidade hemodinâmica. Sobre o caso acima, assinale a alternativa correta.

- A)** Considera reação anafilática à penicilina, interna a paciente e trata com adrenalina associada a metilprednisolona.
- B)** Considera a paciente tratada para sífilis e prescreve dipirona.
- C)** Faz prednisona 1mg/kg por uma semana e repete a penicilina benzatina 2,4 milhões de unidades em uma semana depois da primeira dose.
- D)** Considera ser uma reação alérgica à penicilina. Faz medicações sintomáticas e segue o tratamento da sífilis com doxiciclina por 14 dias

Questão 11

UFES | ES | 2025

Paciente de 68 anos, refere aparecimento de nódulo de tireoide há cerca de 15 anos com crescimento muito lento. Refere que nos últimos 3 meses a região cervical anterior vem aumentando muito de tamanho e se tornando muito endurecida Refere também quadro de dispneia progressiva Nega história familiar de câncer de tireoide. Moradora de Jacaraípe, costuma se alimentar de peixes e mariscos com frequência. Ao exame palpamos aumento difuso da glândula tireoide com consistência pétrea e não conseguimos identificar bem a traqueia. O médico suspeitou de uma neoplasia maligna da glândula tireoide. Dentre as possibilidades, qual a neoplasia maligna mais provável?

- A)** Carcinoma medular de tireoide.
- B)** Carcinoma papilífero de tireoide.
- C)** Carcinoma anaplásico.
- D)** Bócio endêmico.

Questão 12

UFES | ES | 2025

Paciente de 60 anos procura urologista para consulta de rastreamento de câncer de próstata. Traz exames solicitados pelo clínico geral com PSA 6,0 ng/dL e próstata de 25 g ao ultrassom. Assinale a alternativa correta na avaliação e condução do caso.

- A)** A densidade do PSA de 0,24 é um forte preditor de câncer de próstata.
- B)** A ressonância magnética multiparamétrica de próstata ajuda na condução do caso, mas possui baixo valor preditivo negativo.
- C)** A relação do PSA livre/total com valor alto (acima de 20%) é fator preditor de câncer de próstata.
- D)** A pesquisa de mutação somática do gene BRCA deve ser realizada.

Questão 13

UFES | ES | 2025

É indicação de solicitação de exames de coagulação no pré-operatório exceto:

- A)** Portadores de hepatopatias.
 - B)** Cirurgias de médio porte.
 - C)** História de hematomas espontâneos ou sangramentos de difícil controle.
 - D)** Idade maior que 40 anos.
-

Questão 14

UFES | ES | 2025

É indicação de laparotomia exploradora nos ferimentos por arma branca em abdome, exceto:

- A)** Instabilidade hemodinâmica/hipotensão refratária.
 - B)** Hematoma volumoso em flancos.
 - C)** Peritonite.
 - D)** Evisceração.
-

Questão 15

UFES | ES | 2025

Paciente de 42 anos, sexo feminino, deu entrada no Pronto Socorro alegando náuseas, um episódio de vômito e dor em epigástrio e hipocôndrio direito há cerca de 2 horas sem fatores de melhora, sem episódios prévios sem febre. Hábito intestinal preservado, sem comorbidades. Relata ter ingerido pizza há cerca de 4 horas. Diante do quadro, após exames laboratoriais, qual exame de imagem seria melhor indicado?

- A)** Radiografia de abdome agudo.
 - B)** Tomografia de abdome total.
 - C)** Ultrassonografia de abdome total.
 - D)** Ressonância magnética de abdome superior.
-

Questão 16

UFES | ES | 2025

Assinale a melhor conduta imediata para uma paciente de 72 anos, hipertensa e diabética, submetida a angioplastia coronária com stent há 1 mês, que foi admitida no Pronto Socorro após queda da própria altura, com Escala de Coma de Glasgow de 14, pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem déficits motores ou sensitivos.

- A)** Internação em UTI, avaliação neurocirúrgica e observação clínica.
 - B)** RX de crânio e de coluna cervical.
 - C)** Tomografia computadorizada de crânio e de coluna cervical.
 - D)** Alta com orientações de sinais de alarme e retorno ao Pronto Socorro se necessário.
-

Questão 17

UFES | ES | 2025

Paciente feminina, 43 anos, com história de 6 meses de dor epigástrica inespecífica, vômitos, saciedade precoce e perda ponderal. Apresenta diagnóstico de hipotireoidismo e nega cirurgias prévias, tabagismo ou etilismo. Refere que sua mãe é portadora de diabetes e o pai é falecido por tromboembolismo pulmonar. Realizou endoscopia digestiva alta com diagnóstico de adenocarcinoma gástrico bem diferenciado no antro gástrico. O estadiamento clínico não revela comprometimento linfonodal ou metástase à distância. Considerando o tratamento e os cuidados perioperatórios para a paciente do caso acima, assinale a afirmativa correta.

- A)** Deve-se preparar a paciente para gastrectomia total com linfadenectomia D2 em caráter curativo.
- B)** Para o estadiamento oncológico pré-operatório é mandatória a realização de PET-CT.
- C)** Há indicação de profilaxia farmacológica de tromboembolismo venoso profundo no pós-operatório, a ser realizada de preferência com heparina de baixo peso molecular.
- D)** Na antibioticoprofilaxia deve-se incluir cobertura para germes anaeróbios.

Questão 18

UFES | ES | 2025

Sobre a síndrome compartimental abdominal, assinale a alternativa correta.

- A)** Desenvolve-se quando a pressão intra-abdominal (PIA) é de 10 mmHg ou superior, associada a falência orgânica.
- B)** Como possíveis intervenções terapêuticas, prévias à laparotomia descompressiva podemos considerar diálise precoce, utilização de relaxantes neuromusculares e descompressão gástrica.
- C)** Observa-se precocemente aumento da complacência pulmonar e necessidade de pressões ventilatórias crescentes, o que impacta reduzindo a pressão intracraniana.
- D)** Ocorre diminuição da taxa de filtração glomerular consequente à disfunção cardíaca gerada pelo aumento do retorno venoso.

Questão 19

UFES | ES | 2025

Paciente em pós-operatório de troca valvar evolui com quadro de abdome agudo vascular e indicação de laparotomia exploradora, em que foi observada isquemia do ceco com necrose e peritonite localizada. Considere o caso acima e assinale a alternativa correta sobre a anatomia vascular do abdome.

- A)** A artéria acometida é ramo direto da artéria ílfaca interna.
- B)** O território de irrigação da artéria mesentérica Inferior está preservado.
- C)** A veia mesentérica inferior drena o cólon direito e se anastomosa com as veias mesentérica superior e esplênica para formar a veia porta.
- D)** A artéria mesentérica superior emite a artéria cólica média, que é a principal fonte de irrigação para o órgão acometido.

Questão 20

UFES | ES | 2025

Paciente de 75 anos, hipertensa e diabética, submetida a colecistectomia de urgência por colecistite aguda complicada com empiema há 07 dias. Retorna ao Pronto Socorro após a alta hospitalar com quadro de febre, desconforto em hipocôndrio direito, sem icterícia. Após exames diagnósticos foi evidenciado lesão hipodensa sugestiva de abscesso hepático em seguimento VI, de 5x6cm, de aproximadamente 150ml, superficial. Diante do quadro, considerando estar em hospital terciário sem restrições propedêuticas, indique qual a melhor opção terapêutica:

- A)** Hepatectomia posterior direita.
- B)** Laparoscopia com drenagem do local do abscesso e antibioticoterapia.
- C)** Punção guiada por ultrassonografia ou tomografia e antibioticoterapia.
- D)** Antibioticoterapia.

Questão 21

UFES | ES | 2025

Globalmente, o câncer de ovário é o sétimo câncer mais comum entre as mulheres e o terceiro entre as causas ginecológicas. Com relação ao câncer de ovário, assinale a alternativa incorreta.

- A)** A maioria dos tumores malignos de ovário é diagnosticado em fases iniciais devido à grande sensibilidade de marcadores tumorais e a eficácia do rastreamento com exames de imagens cada vez mais sofisticados.
- B)** As mutações dos genes BRCA1 e BRCA2 podem manifestar-se em ampla variedade de condições clínicas, incluindo câncer de mama e de ovários em mulheres e de próstata em homens.
- C)** Entre os fatores de risco mais importantes estão o histórico familiar de câncer de mama ou de ovário.
- D)** Os principais fatores de proteção para o câncer de ovário são os contraceptivos orais, a gravidez, a amamentação e a ligadura de trompas.

Questão 22

UFES | ES | 2025

O câncer de mama é uma questão de saúde mundial e sua incidência vem aumentando em todas as regiões do planeta. Com relação ao câncer de mama, assinale a alternativa correta.

- A)** É o câncer mais frequente na mulher, é mais comum em regiões mais desenvolvidas e é a quinta causa de morte de câncer geral.
 - B)** O tamanho do tumor e o número de linfonodos comprometidos não são fatores prognósticos importantes.
 - C)** O diagnóstico precoce geralmente é feito pela própria paciente palpando o tumor.
 - D)** O estabelecimento de um programa de rastreamento eficiente deve oferecer exames para mulheres assintomáticas de todas as idades, para que o diagnóstico seja realizado numa fase pré-clínica.
-

Questão 23

UFES | ES | 2025

A candidíase vulvovaginal é uma das causas mais comuns de prurido e corrimento vulvovaginal. Enquanto a maioria das mulheres experimentará uma infecção esporádica por *Cândida*, uma pequena porcentagem de pacientes experimentará infecção recorrente. Em relação a infecção por *Cândida*, assinale a alternativa correta.

- A)** O tratamento do parceiro é sempre recomendado, mesmos nos casos assintomáticos.
- B)** O uso de probióticos é sempre recomendado como terapia adjuvante para melhorar a população de lactobacilos.
- C)** Fatores externos como o uso de antibióticos, atividade sexual, vaginose bacteriana recente e dieta podem desencadear um quadro de vaginite aguda.
- D)** Em casos de pacientes grávidas com infecção por *Cândida* recorrente, está indicado terapia de indução oral com fluconazol seguida por manutenção oral prolongada com fluconazol (seis meses ou mais).

Questão 24

UFES | ES | 2025

Indivíduos que desejam e são elegíveis para um dispositivo intrauterino (DIU) devem decidir entre DIUs de cobre e DIUs liberadores de levonogestrel. Em que situação a opção do DIU de levonogestrel em relação ao DIU de cobre seria mais vantajosa?

- A)** Necessidade de redução do sangramento menstrual e da anemia.
- B)** Desejo por contracepção de longo prazo.
- C)** Câncer de mama.
- D)** Doença hepática ativa.

Questão 25

UFES | ES | 2025

Com relação a menopausa, assinale a alternativa correta.

- A)** A menopausa está associada a um declínio acentuado no número de oócitos que é atribuível à atresia progressiva do complemento original de oócitos.
- B)** A diminuição dos folículos em desenvolvimento é refletida em um aumento paralelo na concentração sérica de inibina B, que é provavelmente o marcador mais precoce e facilmente mensurável do declínio folicular.
- C)** Valores baixos de FSH e altos de estradiol podem sugerir menopausa.
- D)** A menopausa antes dos 50 anos é considerada anormal e é referida como insuficiência ovariana primária (anteriormente chamada de insuficiência ovariana prematura).

Questão 26

UFES | ES | 2025

Qual dos seguintes fatores de risco está associado a pré-eclâmpsia em uma gestação?

- A) Idade paterna.
- B) Tabagismo durante a gestação.
- C) Idade materna inferior a 20 anos.
- D) Gestação múltipla.

Questão 27

UFES | ES | 2025

A cesariana a pedido da paciente refere-se a uma cesárea realizada porque a gestante solicita esse método de parto na ausência de uma indicação médica ou uma cesárea realizada porque a gestante desconhece as desvantagens e riscos da cesárea a pedido, porém pode ser considerada prática obstétrica padrão. Existe algumas possíveis vantagens da cesariana em relação ao parto normal:

- A) Menor risco de morbimortalidade perinatal relacionada a gestação pós termo.
- B) Melhor recuperação pós-parto.
- C) Menor incidência de acretismo placentário em gestações posteriores.
- D) Possibilita o início mais precoce do aleitamento materno.

Questão 28

UFES | ES | 2025

Puerpera de duas semanas pós-parto da entrada em setor de urgência apresentando: dor intensa em mama direita, ingurgitamento mamário, hiperemia de grande parte da mama, edema, mas sem ponto de flutuação, febre de 39º C. Qual a melhor conduta a ser tomada nesse caso?

- A) Não interromper a amamentação, proceder o esvaziamento da mama, iniciar antibioticoterapia de amplo espectro e orientar uso de soutien de sustentação.
- B) Orientar a suspensão da amamentação, orientar aplicação de bolsa de água morna, prescrever antiinflamatórios e orientar evitar o uso de soutien.
- C) Prescrever gentamicina 80 mg de 8/8h.
- D) Realizar punção mamária às cegas procurando lojas de abscessos, proceder ordenha manual desprezando o leite retirado, prescrever cabergolina 01 comprimido de 12/12 h.

Questão 29

UFES | ES | 2025

Uma paciente de 35 anos, com história de ligadura tubária, apresenta-se com dor pélvica e abdominal com irradiação para o ombro, de início súbito, sangramento vaginal e sem febre. A ultrassonografia transvaginal mostra uma massa anexial com 8 cm e presença de líquido livre na pelve e no fundo de saco de Douglas. Qual é a principal suspeita clínica e a conduta mais adequada?

- A) Ruptura de cisto ovariano; tratamento conservador com analgésicos.
- B) Doença inflamatória pélvica (DIP); iniciar antibiótico.
- C) Gravidez ectópica rota; realização de laparoscopia/laparotomia imediata.

- D)** Endometrioma; prescrição de anticoncepcional a base de progestágenos.
-

Questão 30

UFES | ES | 2025

Pacientes com mola hidatiforme (geralmente se apresentam a consulta pré-natal com períodos menstruais ausentes, um teste de gravidez positivo e sinais e sintomas consistentes com gravidez precoce ou complicações precoces da gravidez. São características clínicas da mola hidatiforme, exceto:

- A)** Tamanho uterino maior que o esperado para a idade gestacional.
 - B)** Desconforto pélvico.
 - C)** Hipotireoidismo.
 - D)** Cistos tecaluteínicos.
-

Questão 31

UFES | ES | 2025

Criança de 6 anos, admitida na emergência com história de aparecimento súbito de edema labial e urticária generalizada, dispneia e sibilância. Ela estava brincando no quintal da casa quando os sintomas começaram, há cerca de 20 minutos da admissão. Tem antecedente de asma e alergia a proteína do leite de vaca. Ao exame físico, apresentava urticária em face, tronco e membros, angioedema em lábios. À ausculta respiratória, apresentava sibilos inspiratórios e expiratórios, pressão arterial com níveis de 80/50 mmHg e saturação periférica de oxigênio medida em 89% em ar ambiente. Qual a conduta inicial correta?

- A)** Epinefrina subcutânea e suplementação de oxigênio.
 - B)** Epinefrina intramuscular e suplementação de oxigênio.
 - C)** Difenidramina e metilprednisolona intravenosos e suplementação de oxigênio.
 - D)** Prometazina intramuscular, salbutamol aerossol e suplementação de oxigênio.
-

Questão 32

UFES | ES | 2025

Paciente de 7 anos vem comparecendo de forma recorrente à unidade básica de saúde com quadro de tosse e sibilância. Nos últimos 9 meses foram 4 consultas com prescrição de corticoide oral e broncodilatador para uso por 5 dias. Há 3 meses foi prescrito beclometasona inalatória para uso diário (400 mcg/dia) além de orientações sobre redução de alérgenos e irritantes ambientais, mas o paciente não apresenta controle clínico da doença. Qual a conduta mais adequada?

- A)** Encaminhar ao especialista para melhor avaliação da medicação profilática.
 - B)** Aumentar a dose da beclometasona para 600 mcg/dia e reavaliar em 30 dias.
 - C)** Associar broncodilatador de longa ação ao corticoide inalado e reavaliar em 30 dias.
 - D)** Verificar a adesão ao tratamento e a técnica inalatória antes de modificar a terapêutica.
-

Questão 33

UFES | ES | 2025

Sobre hábitos saudáveis da alimentação infantil é correto:

- A)** Alimentos mais alergênicos, como por exemplo peixe, devem ser introduzidos após 1 ano de idade.
- B)** Para as crianças que não aceitam fruta "in natura", os sucos naturais são uma boa opção para ingestão das fibras e vitaminas.
- C)** A papa principal, para crianças entre 6 e 12 meses, deve conter tubérculos, leguminosas e hortaliças amassadas, evitando-se proteína animal devido ao risco de engasgos.
- D)** O consumo, nas refeições, de alimentos contendo vitamina C, frutose e carotenoides aumentam a biodisponibilidade e absorção de ferro.

Questão 34

UFES | ES | 2025

Lactente de 1 ano e 1 mês apresenta estreitamento prepucial distal, que dificulta a exposição da glândula (prepúcio tipo II conforme classificação de Kayaba e colaboradores). Não há outras queixas ou complicações. Qual a conduta mais adequada?

- A)** Expectante, por ser fimose fisiológica nesta idade.
- B)** Iniciar uso de pomada de corticoide duas vezes ao dia e reavaliar em 90 dias.
- C)** Devido ao grau de estreitamento, encaminhar para postectomia.
- D)** Orientar tracionar o prepúcio sequencialmente ao banho ("exercícios para abertura") e reavaliar em 90 dias.

Questão 35

UFES | ES | 2025

Lactente, masculino, 8 meses de idade, vai para consulta de puericultura. Ao checar o cartão de vacina, você observa que a criança só recebeu as vacinas no momento do parto. Quais vacinas indicadas para este bebê logo após a consulta?

- A)** Pneumocócica 10-valente, Meningocócica C, Pentavalente, VIP (vacina poliomielite inativada) e rotavírus.
- B)** Pneumocócica 10-valente, Meningocócica C, Pentavalente e Febre amarela.
- C)** Meningocócica C, Pentavalente, VIP (vacina poliomielite inativada), Febre amarela e Rotavírus.
- D)** Pneumocócica 10-valente, Meningocócica C, Pentavalente e VIP (vacina poliomielite inativada).

Questão 36

UFES | ES | 2025

Menina de 11 anos, com história de 3 meses apresenta quadro de poliúria, polidipsia e perda de peso. Na avaliação pediátrica foi suspeitado de Diabetes Mellito. Quais exames

complementares que podem reforçar o diagnóstico?

- A)** Glicemia de jejum de 130 mg/dl.
- B)** Glicemia ao acaso (aleatória) de 150 mg/dl.
- C)** Glicemia duas horas após teste de sobrecarga oral de glicose de 170 mg/dl.
- D)** Hemoglobina glicada (HbA1c) de 6,0%.

Questão 37

UFES | ES | 2025

Menino de 3 anos há 4 dias com febre alta, queda do estado geral, tosse e dificuldade respiratória. Exame físico: irritado, esforço respiratório moderado, frequência cardíaca de 148 bpm, frequência respiratória de 60 Jrpm, saturação periférica de oxigênio 90%. Murmúrio vesicular abolido em base direita. Radiografia de tórax: I Pneumonia direita com derrame pleural volumoso. Foi realizada toracocentese. Assinale a alternativa em que as três características do líquido pleural são indicações de drenagem pleural:

- A)** Líquido de aspecto purulento, glicose pleural: 30 mg/dl e pH: 7,1.
- B)** Líquido de aspecto leitoso, glicose pleural: 60 mg/dl e pH: 7,4.
- C)** Líquido de aspecto amarelo-citrino, glicose pleural: 45 mg/dl e pH: 7,3.
- D)** Líquido de aspecto hemorrágico, glicose pleural: 55 mg/dl e pH: 7,2.

Questão 38

UFES | ES | 2025

Menino, 9 anos, com quadro de dificuldade de aprendizagem e sintomas evidentes e persistentes de hiperatividade/impulsividade e desatenção há mais 3 anos. A suspeita é de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Considerando essa hipótese e os critérios diagnósticos, assinale a afirmativa correta.

- A)** Os sintomas de desatenção e/ou hiperatividade e impulsividade devem estar presentes antes dos 18 anos de idade.
- B)** Os sintomas de desatenção e/ou hiperatividade e impulsividade devem estar presentes em no mínimo 2 ambientes diferentes.
- C)** Os sintomas podem ser discretos e não interferirem ou reduzirem a qualidade do funcionamento social, acadêmico ou ocupacional.
- D)** Os sintomas podem ocorrer exclusivamente durante o curso de transtornos psicóticos ou esquizofrenia.

Questão 39

UFES | ES | 2025

Recém-nascido (RN) masculino, 40 horas de vida, foi submetido ao teste de triagem neonatal para cardiopatia congênita crítica (teste do coraçãozinho) que detectou oximetria de pulso em membro superior direito de 94% e em membro inferior direito de 89%. O teste foi repetido por 2 vezes, com intervalos de 1 hora, e os resultados foram mantidos. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta inicial para o RN.

- A)** Alta hospitalar com encaminhamento ao cardiologista pediátrico para avaliação e repetição do teste em 7 dias.
- B)** Alta hospitalar com encaminhamento ao pediatra para acompanhamento em puericultura e repetição do teste em 30 dias.
- C)** Alta hospitalar e repetir o teste em 15 dias com orientações de retorno à maternidade em caso de taquicardia, taquipnéia ou cansaço às mamadas.
- D)** Não liberar a alta hospitalar até o esclarecimento diagnóstico com a avaliação cardiológica e neonatal completas (exame clínico e ecocardiograma).

Questão 40

UFES | ES | 2025

Lactente de 12 meses previamente hígido, é trazido ao Pronto Atendimento devido a irritabilidade e febre alta há quatro dias. A mãe informa que, há uma semana, o lactente ficou resfriado e houve piora do quadro nos três últimos dias, com prostração e recusa alimentar. Ao exame físico, encontra-se toxemiado, com membrana timpânica abaulada e hiperemiada à direita. Apresenta também hiperemia e dor retroauricular homolateral, com desaparecimento do sulco retroauricular. O diagnóstico e a conduta inicial são:

- A)** Otite média aguda à direita, iniciar amoxicilina 50 mg/kg/dia e pedir para retornar em 72 horas.
- B)** Otite média aguda com dermatite seborreica, iniciar cefalexina 50 mg/kg/dia) e pedir para retornar em 48 horas.
- C)** Otite média aguda com mastoidite à direita, solicitar internação hospitalar, iniciar ceftriaxona parenteral e solicitar tomografia axial computadorizada.
- D)** Otite média aguda à direita, iniciar amoxicilina + ácido clavulânico (respectivamente 50mg + 12,5mg/kg/dia), de 12/12 horas e pedir para retornar em 72 horas.

Questão 41

UFES | ES | 2025

Paciente de 60 anos, com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, é atendido em uma unidade Básica de Saúde com queixa de disfunção erétil. Qual das alternativas abaixo apresenta a melhor forma de registrar o atendimento em um SOAP para registro da consulta no prontuário. Em qual alternativa o registro está feito de maneira incorreta?

- A)** S- Pressão arterial de 150/100mmHg. Hemoglobina glicada de 10%.
- B)** O- Traz Doppler de membros inferiores realizado há 1 mês com resultado dentro da normalidade.
- C)** A- Diabetes não controlada. Disfunção erétil. Medo de não conseguir mais ter relações sexuais.
- D)** P- Ajusto dose da glicazida. Oriente perda de peso. Avaliar prescrição de tadalafila na próxima consulta.

Questão 42

UFES | ES | 2025

Médica de Família e Comunidade atende uma paciente que recebeu diagnóstico de esclerose múltipla recentemente, apresentando no momento apenas alteração visual. A abordagem revela uma pessoa que executa suas atividades rotineiras sem limitações, mas que está com medo de ficar acamada ou morrer antes de ver seu filho terminar a faculdade. Neste relato, não são explorados quais dimensões da experiência singular de adoecimento desta paciente, levando-se em consideração o primeiro componente do Método Clínico Centrado na Pessoa?

- A) Sentimentos e função.
- B) Ideia e função.
- C) Ideia e expectativas.
- D) Sentimentos e expectativas.

Questão 43

UFES | ES | 2025

Paciente feminina, 38 anos, procura a Unidade de Saúde da Família (USF) onde é cadastrada há 5 anos, queixando-se de fadiga há 3 meses. Ela é conhecida da equipe de saúde, sendo atendida sempre por sua médica e enfermeira de família e comunidade desde que foi cadastrada na USF. Neste atendimento, sua MFC (médica de família e comunidade) aborda o problema principal, identifica a necessidade e realiza exame preventivo de câncer de colo de útero, agenda inserção de DIU e encaminha a paciente à média complexidade para avaliação diagnóstica. Três meses depois, no retorno com sua MFC, a paciente informa que esqueceu em casa as receitas feitas pelo especialista focal e o prontuário eletrônico da USF não tem interoperabilidade com o usado na média complexidade. Neste caso, qual atributo da Atenção Primária à Saúde, pensado a partir dos estudos de Barbara Starfield, se mostra mais frágil?

- A) Longitudinalidade do cuidado.
- B) Acessibilidade.
- C) Abrangência de cuidado.
- D) Coordenação do cuidado.

Questão 44

UFES | ES | 2025

São aspectos de relevância para uma prática médica orientada pela prevenção quaternária, exceto?

- A) Aplicação dos fundamentos da saúde baseada em evidências.
- B) Reflexão sobre os limites éticos das intervenções em saúde.
- C) Reforço das hierarquias existentes entre médico, equipe de saúde e pacientes.
- D) A construção de uma relação médico-paciente de confiança.

Questão 45

UFES | ES | 2025

São elementos fundamentais na construção de um Genograma para abordagem familiar na Atenção Primária à Saúde, exceto?

- A) Informações sociodemográficas e epidemiológicas relevantes sobre os membros da família.
- B) No mínimo duas gerações da família, incluindo informações relevantes sobre padrões de comportamento.
- C) Símbolos que representem a qualidade das relações estabelecidas entre os membros da família.
- D) Disposição dos símbolos de forma a representar os núcleos familiares (ex. núcleo parental).

Questão 46

UFES | ES | 2025

Conforme a Lei 8080, de 1990, a partir da redação dada pela Lei nº 14.737, de 2023, é direito de toda mulher, em consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde públicas ou privadas:

- A) Fazer-se acompanhar por pessoa de qualquer idade em qualquer procedimento realizado.
- B) Fazer-se acompanhar por acompanhante que seja profissional de saúde em procedimento realizado em centro cirúrgico com restrições relacionadas à segurança.
- C) Fazer-se acompanhar por pessoa maior de idade durante todo atendimento, exceto durante a realização de procedimentos invasivos de qualquer natureza.
- D) Fazer-se acompanhar por profissional de saúde do sexo feminino quando outra pessoa de sua preferência não for indicada, desde que arque com os custos.

Questão 47

UFES | ES | 2025

Um estudo de caso-controle foi conduzido para investigar a relação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e o desenvolvimento de câncer de cólon. Foram selecionados, de forma rigorosa e pareada, 200 pacientes com câncer de cólon e 200 indivíduos sem a doença. Os participantes foram entrevistados sobre seus hábitos alimentares nos últimos cinco anos, utilizando questionário padronizado e recomendado para este fim. Os dados mostraram que as pessoas com câncer de cólon consumiram mais alimentos ultraprocessados em comparação aos controles. Com base nesta descrição do estudo, qual é o principal tipo de viés que pode afetar os resultados?

- A) Viés de seleção.
- B) Viés de desempenho.
- C) Viés de memória.
- D) Viés de informação.

Questão 48

UFES | ES | 2025

Médico de família e comunidade (MFC) atende paciente que traz um exame complementar solicitado por outro médico. O resultado deste exame é positivo, mas o MFC quer saber qual a

probabilidade deste resultado de exame significar a presença do problema de saúde investigado. Neste caso, é importante o MFC conhecer qual atributo deste exame?

- A)** Sensibilidade.
 - B)** Especificidade.
 - C)** Número Necessário para Tratar.
 - D)** Valor Preditivo Positivo.
-

Questão 49

UFES | ES | 2025

Sobre a razão de mortalidade materna, está correto:

- A)** Estima a frequência de óbitos femininos, ocorridos até 42 dias após o término da gravidez, atribuídos a causas ligadas à gravidez, ao parto e ao puerpério, em relação ao total de nascidos vivos.
 - B)** Estima a frequência de óbitos femininos, ocorridos até o momento do parto, atribuídos a causas ligadas a gravidez, ao parto e ao puerpério, em relação ao total de gestações.
 - C)** Estima a frequência de óbitos femininos, ocorridos até 14 dias após o término da gravidez, atribuídos a qualquer causa, em relação ao total de nascidos vivos.
 - D)** Estima a frequência de óbitos femininos, ocorridos até 30 dias após o término da gravidez, atribuídos a qualquer causa, em relação ao total de nascidos vivos.
-

Questão 50

UFES | ES | 2025

Em relação ao movimento da Promoção da Saúde, a Carta de Ottawa, 1986, traz definições e linhas de ação que tiveram grande importância na história da organização social. Dentre os campos de ação para a promoção de saúde definidas neste documento, não se encontra:

- A)** Elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis.
- B)** Reforço da ação comunitária.
- C)** Reorientação do sistema e serviços de saúde.
- D)** Investimento prioritário na incorporação de tecnologias de informação e comunicação.