

FUBOG

2025 | GO | 100 Questões



Questão 1

FUBOG | GO | 2025

Paciente, sexo masculino, 56 anos, trabalhador da zona rural, chega à emergência do Hospital Universitário em Recife, com quadro de hematêmese em moderada quantidade, de início há 01 hora. Aponta fezes de aspecto “mais enegrecido” (SIC), há 04 dias. Nega demais queixas no momento e episódios prévios semelhantes. Paciente relata ser portador de artrite reumatoide. Endoscopia digestiva alta - Esôfago: forma, calibre, mucosa e distensibilidade normais. Padrão vascular revela um cordão varicoso de médio calibre e dois cordões varicosos de pequeno calibre, azulados, ausência de úlceras, lesões e de manchas vermelhas em terço distal. A transição esofagogástrica encontra-se coincidente com o pinçamento diafragmático. Estômago: Úlcera gástrica na localização de corpo gástrico, com sangramento ativo em jato. Sobre o caso, há as seguintes afirmativas:

- I. Trata-se de um caso de hemorragia digestiva alta.
- II. Os achados de hematêmese e melena sugerem uma fonte proximal ao ângulo de Treitz.
- III. Doença ulcerosa péptica pode ser descartada como hipótese diagnóstica, neste caso.

Dessa forma, é CORRETO afirmar:

- A)** Apenas I e II estão corretas.
- B)** Apenas II está correta.
- C)** Apenas III está correta.
- D)** Apenas II e III estão corretas.

Questão 2

FUBOG | GO | 2025

Paciente, sexo masculino, 49 anos, farmacêutico, com antecedentes de HAS e DM 2 em uso irregular de losartana, hidroclorotiazida e metformina. Deu entrada no serviço de emergência do hospital, transportado pelo SAMU, com relato de hemiparesia braquifacial à direita, de início súbito, além de disartria há 1h30 da admissão. Nega histórico de trauma, convulsão, sangramentos, cirurgia recente ou episódios semelhantes anteriormente. Ao exame físico: estado geral regular, desidratado 1+/4+, anictérico, afebril; ritmo cardíaco irregular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopro, frequência cardíaca: 125 bpm, PA: 180 x 100 mmHg; FR: 18 irpm, SatO₂: 98%; ECG 14 (AO 4 / RV: 4 / RM 6), vigil, disartrico, pupilas isofotorreagentes, força muscular 0/5 em hemicorpo direito e 5/5 em hemicorpo esquerdo; NIHSS: 12 (4. 2 + 5a. 4+ 6a 4+ 10. 2); Rankin prévio à admissão 0 e sem resultado de exames laboratoriais. Sobre o caso, é CORRETO afirmar:

- A)** Inicialmente são necessárias a monitorização e a reposição de glicose do paciente.
- B)** Uma TC de crânio com contraste deve ser realizada o mais rápido possível.
- C)** O trombolítico mais usado é o Alteplase, na dose 0,5 mg/Kg IV.
- D)** O diagnóstico possui como os principais mecanismos a embolia e a aterotrombose.

Questão 3

FUBOG | GO | 2025

Paciente, sexo feminino, 65 anos, com antecedente de diabetes mellitus 2, há mais de 20

anos, em tratamento médico irregular e sem controle das doenças de base. Deu entrada no hospital universitário com queixa de inapetência, astenia e sonolência, iniciados há 2 dias. O acompanhante relata que nas últimas 24h os sintomas pioraram e vêm evoluindo com náuseas e vômitos. Nega febre, diarreia, redução da excreção urinária, sintomas gripais ou quadro semelhante anteriormente. Acompanhante informa que o paciente está em uso apenas das medicações domiciliares: sinvastatina 20 mg/dia e metformina 1000 mg/dia. Na inspeção física: frequência cardíaca de 120 bpm, frequência respiratória de 25 rpm, saturação 96%, PA 120/80 mmHg, sem alteração em ausculta cardíacas e respiratória, dor a palpação profunda de epigástrio. Exames Complementares: HGT: 192 mg/dL ; hemoglobina: 11.2 g/dl ; hematócrito: 33% ; VCM: 88 fL; HCM: 28 pg ; leucócitos: 6710/mm³ ; eosinófilos: 300/mm³ ; segmentados: 3800/mm³; linfócitos totais: 2410/mm³; monócitos: 200/mm²; plaquetas: 170.000/mm³ ; creatinina: 4.1 mg/dL ; ureia: 104 mg/dL; sumário de urina sem alterações; gasometria arterial: pH 7.18 ; HCO₃: 12 mmol/L ; PCO₂: 22 mmHg ; lactato 6.3 mmol/L ; BE: - 2 mmol/L ; potássio: 5.9mmol/L; sódio: 138 mmol/L; cloro: 108 mmol/L; albumina sérica: 3.0 mg/dL. Sobre o caso, é CORRETO afirmar:

- A)** A alcalose respiratória se deve à compensação pulmonar com liberação pO₂ na tentativa de normalizar o PH.
- B)** A acidose metabólica com ânion gap elevado se deve à produção de ácido láctico secundário ao uso de metformina.
- C)** A acidose láctica por uso metformina ocorre em casos em que seu uso está inadequado: contraindicada em TFG < 45mL/min/1.73m².
- D)** Reposição de bicarbonato não é uma alternativa apropriada para o caso.

Questão 4

FUBOG | GO | 2025

Com relação ao rastreamento para displasia evolutiva do quadril na infância, é CORRETO afirmar:

- A)** Manobra de Barlow não é mais utilizada no rastreio de displasia do quadril.
- B)** O diagnóstico precoce antes dos 3 a 6 meses de idade não impacta na escolha de tratamentos.
- C)** Gênero masculino é fator de risco para displasia de quadril.
- D)** A manobra de Ortolani provoca a redução do quadril.

Questão 5

FUBOG | GO | 2025

A vacinação é a melhor maneira de proteger a criança contra doenças imunopreveníveis. Dessa forma, é CORRETO afirmar:

- A)** A vacina BCG é necessária em dose única ao nascer.
 - B)** Vacina contra poliomielite 1^o, 2^o e 3^o doses inativadas: a primeira dose é necessária aos 3 meses de idade.
 - C)** Vacina pneumocócica 10-valente: a primeira dose é necessária aos 4 meses de idade.
 - D)** Vacina Covid-19: a primeira dose é necessária no 1^o ano de idade.
-

Questão 6

FUBOG | GO | 2025

Paciente, sexo masculino, 60 anos, hipertenso e portador de cirrose hepática secundária ao etilismo, procura o pronto atendimento queixando-se de dor abdominal há dois dias. Exame físico: estado geral regular, eupneico, ictérico (+/4+), com escala de Glasgow 14 (desorientado). Sem flapping, apresentando sinais vitais estáveis. Ausculta pulmonar e ausculta cardíaca sem alterações. Abdome globoso, flácido e indolor, com presença de maciez móvel, além de semicírculo de Skoda. O toque retal não foi efetuado. Foi realizada paracentese diagnóstica com saída de líquido amarelo citrino. A análise do líquido mostrou o seguinte: albumina: 0,1 g/dL; proteínas totais: 0,6g/dL; glicose: 110 mg/dL; total de células nucleadas: 1440 /mm³ (70% neutrófilos, 10% linfócitos); cultura aeróbia do líquido ascético: *Klebsiella pneumoniae* (multissensível). Sobre o caso, há as seguintes afirmativas:

- I. A principal suspeita diagnóstica é a Peritonite Bacteriana Espontânea (PBE).
- II. Cefalosporinas de 3ª geração são consideradas antibióticos empíricos de primeira escolha no tratamento desses casos.
- III. O tratamento com antibiótico deve ser iniciado após o resultado de cultura positiva.

Considerando-se as afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F), a alternativa CORRETA é:

- A) V, F, F.
- B) V, V, V.
- C) V, V, F.
- D) F, F, F.

Questão 7

FUBOG | GO | 2025

No Brasil, o câncer de colo do útero, também conhecido como câncer cervical, é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Sobre o tema, é CORRETO afirmar:

- A) Com exceção do câncer colorretal, este tumor é o que apresenta maior potencial de prevenção e cura quando diagnosticado precocemente.
- B) Alcançar alta cobertura no rastreamento da população definida como alvo é o componente mais importante para obter uma significativa redução na incidência e na mortalidade por câncer de colo do útero.
- C) A colposcopia é a principal estratégia de rastreamento do câncer de colo do útero e de suas lesões precursoras.
- D) Um público que exige menos atenção das equipes de saúde é a mulher com identidade homossexual.

Questão 8

FUBOG | GO | 2025

A saúde reprodutiva implica que a pessoa possa ter uma vida sexual segura e satisfatória, com autonomia para se reproduzir e a liberdade de decidir sobre quando e quantas vezes deve fazê-lo. Devem, portanto, ser ofertados a homens e mulheres adultos, jovens e adolescentes informações, acesso e escolha a métodos eficientes, seguros, permissíveis,

aceitáveis e não contrários à Lei nº 9.263/1996, além da oferta de outros métodos de regulação da fecundidade e o direito ao acesso a serviços apropriados de saúde para pré-natal, parto e puerpério. Neste contexto, é CORRETO afirmar:

- A)** A inseminação artificial e a fertilização in vitro estão disponíveis pelo SUS, caso haja diagnóstico de infertilidade.
- B)** O planejamento reprodutivo baseia-se em ações clínicas, preventivas, educativas, além da oferta de informações, meios, métodos e técnicas para incentivar a fecundidade.
- C)** É menos importante realizar ações de planejamento reprodutivo para mulheres lésbicas e bissexuais.
- D)** O planejamento reprodutivo engloba adultos, jovens e adolescentes, com vida sexual ativa com ou sem parceiros estáveis, bem como aqueles que se preparam para iniciar sua vida sexual.

Questão 9

FUBOG | GO | 2025

Entre os objetivos e usos da vigilância em saúde pública estão:

- A)** Identificar, quantificar e monitorar as tendências e padrões do processo saúde-doença nas populações.
- B)** Detectar mudanças crônicas na ocorrência e na distribuição das doenças.
- C)** Realizar mudanças nos padrões de ocorrência dos agentes e hospedeiros.
- D)** Investigar mesmo sem ter como controlar as doenças.

Questão 10

FUBOG | GO | 2025

São quatro as etapas básicas da vigilância e cada uma delas tem atividades e responsáveis específicos dentro do sistema. Sobre isso, há as seguintes afirmativas:

- I. É necessário contar com dados de população para usar como denominadores no sistema de vigilância.
- II. A análise envolve principalmente um processo de descrição e comparação de dados com relação a características e atributos de tempo, lugar e pessoa.
- III. A interpretação dos dados serve para a geração de hipóteses.

Dessa forma, é CORRETO afirmar:

- A)** Apenas III está correta.
- B)** Apenas II está correta.
- C)** Apenas II e III estão corretas.
- D)** Todas estão corretas.

Questão 11

FUBOG | GO | 2025

Segundo o código de ética médica, é vedado ao médico:

- A)** Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas.
- B)** Prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da morte do paciente sob seus cuidados, além das contidas na declaração de óbito.
- C)** Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, paciente e terceiros.
- D)** Requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.

Questão 12

FUBOG | GO | 2025

No Brasil, a ética médica é normatizada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) desde 1957, em suas diferentes hierarquias normativas (Código de Ética Médica, Resoluções e Pareceres), e pelos Conselhos Regionais de Medicina (CRM). Segundo o Código De Ética Médica, é CORRETO afirmar:

- A)** É concedido ao médico: ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações.
- B)** É vedado ao médico: liberar cópias do prontuário sob sua guarda, salvo quando autorizado, por escrito pelo paciente, para atender a ordem judicial ou para a sua própria defesa.
- C)** É permitido ao médico: revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.
- D)** O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, sem exceção dos casos previstos em lei.

Questão 13

FUBOG | GO | 2025

Com relação às patologias mais comuns entre os brasileiros, é CORRETO afirmar:

- A)** Não há evidências de que hábitos saudáveis e uma alimentação equilibrada influenciam o surgimento de Alzheimer.
- B)** O Brasil ocupa o terceiro lugar mundial em número de casos de depressão.
- C)** O diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral (AVC) é estabelecido por meio da avaliação clínica do paciente.
- D)** A hipertensão manifesta-se com sinais evidentes.

Questão 14

FUBOG | GO | 2025

A medicina preventiva é categorizada em quatro níveis principais: prevenção primária,

secundária, terciária e quaternária, cada um abordando diferentes estágios do processo de doença e saúde. A respeito do assunto abordado, é CORRETO afirmar:

- A)** O foco do quarto nível é melhorar a qualidade de vida e aumentar a expectativa de vida.
- B)** As intervenções na prevenção secundária incluem o diagnóstico precoce e o tratamento inicial.
- C)** O terceiro nível visa reduzir o impacto de uma doença sendo estabelecida.
- D)** Saneamento básico faz parte da prevenção primária.

Questão 15

FUBOG | GO | 2025

Os anestésicos são divididos em anestésicos gerais e anestésicos locais, que se diferem principalmente pela capacidade de induzir ou não a perda da consciência. Sobre o assunto, há as seguintes afirmativas:

I. Os anestésicos gerais levam à perda da percepção e resposta aos estímulos externos, cursando com perda da consciência, amnésia anterógrada, analgesia, inibição dos reflexos autônomos e relaxamento da musculatura esquelética.

II. Bloqueio neuromuscular: pode ser feito com succinilcolina ou rocurônio para facilitar a intubação orotraqueal.

III. Opioides não podem ser utilizados para controle dos reflexos autonômicos, somente como para auxílio na analgesia.

Considerando-se as afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F), a alternativa CORRETA é:

- A)** V, V, F.
- B)** V, V, V.
- C)** V, F, F.
- D)** F, F, F.

Questão 16

FUBOG | GO | 2025

Sobre fraturas ósseas, é CORRETO afirmar:

- A)** A necrose asséptica é uma complicação precoce associada a fraturas.
- B)** Fraturas por estresse representam o estágio final das lesões por estresse nos ossos.
- C)** A formação do calo ósseo ocorre no estágio inicial da consolidação da fratura.
- D)** A pseudoartrose é uma complicação imediata das fraturas.

Questão 17

FUBOG | GO | 2025

A Insuficiência Cardíaca (IC) corresponde à incapacidade do coração em bombear o sangue adequadamente devido à disfunção sistólica, diastólica ou ambas, de um ou dos dois ventrículos. A respeito do assunto, é CORRETO afirmar:

- A)** No estágio A da doença, embora o paciente tenha o risco de desenvolvimento da insuficiência cardíaca, ainda não existem sinais de comprometimento estrutural cardíaco, ou sintomas da doença.
- B)** A presença de 2 critérios maiores ou 1 critério maior e 1 critério menor (critérios de Framingham) confirmam o diagnóstico de insuficiência cardíaca.
- C)** Diuréticos tiazídicos aumentam a sobrevida do paciente com IC.
- D)** A hipertensão arterial é a principal causa de insuficiência cardíaca, superando a obstrução das artérias do coração.

Questão 18

FUBOG | GO | 2025

Os transtornos de humor são distúrbios emocionais que consistem em períodos prolongados de tristeza, humor elevado, ou ambos. Transtornos do humor podem ocorrer em adultos, adolescentes ou crianças. Sobre o tema, é CORRETO afirmar:

- A)** A classe medicamentosa dos ansiolíticos e antidepressivos é a primeira linha de tratamento para transtornos do humor.
- B)** Transtorno de ansiedade generalizada faz parte dos transtornos de humor.
- C)** Transtorno bipolar I: é definido como a presença de pelo menos um episódio maníaco completo e, na maioria das vezes, episódios depressivos.
- D)** Transtorno bipolar II: é definido pela presença de episódios depressivos maiores com pelo menos um episódio maníaco.

Questão 19

FUBOG | GO | 2025

De acordo com as técnicas cirúrgicas utilizadas em bariátricas, é CORRETO afirmar:

- A)** Cirurgia de Sleeve é considerada restritiva e metabólica, nela o estômago é transformado em um tubo, com capacidade de 400 a 500 ml.
- B)** Bypass gástrico é a técnica bariátrica mais praticada no Brasil, correspondendo a 75% das cirurgias realizadas.
- C)** Banda gástrica ajustável ainda é amplamente utilizada, apesar de ter sido uma das primeiras técnicas criadas.
- D)** Duodenal Switch é a associação entre gastrectomia vertical e banda gástrica ajustável.

Questão 20

FUBOG | GO | 2025

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) podem se manifestar por meio de lesões, corrimentos, entre outros possíveis sintomas, como dor pélvica, disúria, lesões de pele e o aumento de linfonodos. A respeito do assunto, é CORRETO afirmar:

- A)** Sífilis primária pode atingir e ter repercussão no sistema nervoso central.
- B)** O corrimento vaginal é um sintoma muito comum e suas causas são sempre consideradas ISTs.

- C) Condilomas anogenitais são comuns em infecções por clamídia.
- D) Para interromper a transmissão dessas infecções e evitar a reinfecção, é fundamental que os parceiros também sejam testados e tratados.

Questão 21

FUBOG | GO | 2025

Paciente, sexo feminino, 2 anos, foi diagnosticada com bronquiolite após apresentar chiado no peito e dificuldade para respirar. Ela não tem histórico de asma na família. Sobre o caso, há as seguintes afirmativas:

- I. A bronquiolite é geralmente causada por uma infecção bacteriana ou viral, a depender do caso.
- II. A nebulização pode ser um tratamento eficaz, porém não o único, para aliviar os sintomas da criança.
- III. A bronquiolite é mais comum em crianças menores de dois anos.

Dessa forma, é CORRETO afirmar:

- A) Apenas I e III estão corretas.
- B) Apenas II está correta.
- C) Apenas II e III estão corretas.
- D) Apenas III está correta.

Questão 22

FUBOG | GO | 2025

Paciente, sexo masculino, 3 anos, apresenta febre alta que desaparece subitamente, seguida por um exantema maculopapular que se inicia no tronco e se espalha para o rosto e membros, sem outros sintomas significativos. A mãe nega relatos de colegas com sintomas semelhantes. Nesse caso, a doença exantemática mais provável é:

- A) Exantema súbito.
- B) Varicela.
- C) Sarampo.
- D) Eritema infeccioso.

Questão 23

FUBOG | GO | 2025

A última doença erradicada no Brasil graças às campanhas de vacinação do Programa Nacional de Imunização (PNI) é:

- A) Sarampo.
 - B) Rubéola.
 - C) Varíola.
 - D) Poliomielite.
-

Questão 24

FUBOG | GO | 2025

A recomendação do Ministério da Saúde para o aleitamento materno exclusivo é:

- A) Até os seis meses de idade.
- B) Até os três meses de idade.
- C) Até os nove meses de idade.
- D) Até os doze meses de idade.

Questão 25

FUBOG | GO | 2025

As áreas de avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor segundo o teste de Gesell são:

- A) Motora grosseira, motora fina, pessoal-social e emocional.
- B) Motora grosseira, motora fina, cognitiva e emocional.
- C) Motora grosseira, cognitiva, social e linguagem.
- D) Motora grosseira, motora fina, pessoal-social e linguagem.

Questão 26

FUBOG | GO | 2025

Um recém-nascido, aos cinco minutos de vida, apresenta choro vigoroso, frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto, chora quando estimulado, tem movimentos ativos e a pele rosada. Sobre o caso, há as seguintes afirmativas:

- I. O choro vigoroso recebe 2 pontos na escala de Apgar.
- II. A frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto recebe 2 pontos na escala de Apgar.
- III. A resposta ao estímulo com choro recebe 1 ponto na escala de Apgar.

Considerando-se as afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F), a alternativa CORRETA é:

- A) V, V, V.
- B) V, F, V.
- C) V, V, F.
- D) F, F, F.

Questão 27

FUBOG | GO | 2025

Com base no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da leucemia mieloide crônica de crianças e adolescentes, o critério de inclusão para o tratamento com Inibidores de Tirosina-quinase (ITQ) em pacientes pediátricos com diagnóstico é:

- A) Confirmado de leucemia mieloide crônica em fase crônica.
- B) De leucemia mieloide crônica em fase acelerada.
- C) De leucemia mieloide crônica em fase blástica.

D) De leucemia mieloide crônica sem necessidade de confirmação laboratorial.

Questão 28

FUBOG | GO | 2025

Com base no protocolo do Ministério da Saúde para a avaliação e conduta da epilepsia na atenção básica, o principal critério para o diagnóstico de epilepsia em crianças é:

- A)** A presença de crises convulsivas provocadas por infecções agudas.
- B)** A presença de uma única crise convulsiva acompanhada de febre alta.
- C)** A ocorrência de crises convulsivas exclusivamente durante o sono.
- D)** A presença de duas ou mais crises não provocadas com intervalo maior do que 24 horas.

Questão 29

FUBOG | GO | 2025

De acordo com o consenso brasileiro sobre alergia alimentar, a principal vantagem da utilização de fórmulas extensamente hidrolisadas em comparação com fórmulas parcialmente hidrolisadas no manejo de alergia ao leite de vaca em lactentes é:

- A)** São mais eficazes na prevenção de alergias alimentares em lactentes de alto risco.
- B)** São mais eficazes na indução de tolerância oral em lactentes com alergia ao leite de vaca.
- C)** São mais palatáveis e aceitas pelos lactentes.
- D)** São mais econômicas e acessíveis para as famílias.

Questão 30

FUBOG | GO | 2025

Paciente, 6 anos, apresenta quadro de infecção bacteriana pelo estreptococo do grupo A, com exantema, odinofagia e febre alta (38,4°C). A mãe notou o aparecimento de palidez em região perioral, como na imagem a seguir:

Esse sinal é característico do quadro clínico da criança e é conhecido como:



- A)** Sinal da Pastia.

- B)** Sinal de Koplik.
 - C)** Sinal de Filatov.
 - D)** Sinal de Kawasaki.
-

Questão 31

FUBOG | GO | 2025

Paciente, sexo masculino, 7 anos, apresenta coceira intensa, especialmente à noite, e erupções cutâneas com pequenas bolhas e linhas finas nos espaços entre os dedos, pulsos e axilas. Sua mãe relata que os sintomas começaram após uma visita a um acampamento escolar. Sobre o caso, há as seguintes afirmativas:

- I. A escabiose é causada pelo ácaro *Sarcoptes Pediculosos*.
- II. A transmissão da escabiose ocorre principalmente pelo contato direto pele a pele.
- III. O tratamento de escolha para escabiose é a aplicação de antibióticos tópicos.

Dessa forma, é CORRETO afirmar:

- A)** Apenas II está correta.
 - B)** Apenas I está correta.
 - C)** Apenas III está correta.
 - D)** Apenas II e III estão corretas.
-

Questão 32

FUBOG | GO | 2025

Entre as combinações a seguir, a que classifica um recém-nascido como Pequeno para a Idade Gestacional (PIG), considerando a idade gestacional e peso ao nascer, é:

- A)** 34 semanas e 2500 g.
 - B)** 38 semanas e 1900 g.
 - C)** 36 semanas e 1800 g.
 - D)** 40 semanas e 2100 g.
-

Questão 33

FUBOG | GO | 2025

A classificação para a asma em um paciente que apresenta sintomas diurnos mais de duas vezes por semana, mas menos de uma vez por dia, e desperta à noite com sintomas mais de duas vezes por mês é:

- A)** Asma intermitente.
 - B)** Asma persistente leve.
 - C)** Asma persistente moderada.
 - D)** Asma persistente moderada a grave.
-

Questão 34

FUBOG | GO | 2025

A causa mais comum de Síndrome nefrótica em crianças é:

- A)** Nefrite lúpica.
- B)** Glomeruloesclerose segmentar e focal.
- C)** Nefropatia membranosa.
- D)** Doença de lesões mínimas.

Questão 35

FUBOG | GO | 2025

A forma mais comum de cardiopatia congênita é:

- A)** Coarctação da aorta.
- B)** Comunicação Interventricular (CIV).
- C)** Tetralogia de Fallot.
- D)** Transposição das grandes artérias.

Questão 36

FUBOG | GO | 2025

Paciente, sexo feminino, 3 anos, apresenta bolhas flácidas e superficiais no tronco, que se rompem facilmente, deixando uma base úmida e eritematosa. Sobre o caso, há as seguintes afirmativas:

- I. O diagnóstico mais provável é impetigo bolhoso.
- II. O impetigo bolhoso é causado por *Streptococcus pyogenes*.
- III. A antibioticoterapia deve ser realizada preferencialmente por cefalosporina de 3ª geração.

Considerando-se as afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F), a alternativa CORRETA é:

- A)** F, F, F.
- B)** V, V, V.
- C)** V, V, F.
- D)** V, F, F.

Questão 37

FUBOG | GO | 2025

Entre os achados laboratoriais a seguir, o mais indicativo de cetoacidose diabética é:

- A)** Glicemia > 250 mg/dL, pH > 7,3, cetonemia negativa.
- B)** Glicemia < 250 mg/dL, pH > 7,5, cetonemia positiva.
- C)** Glicemia > 250 mg/dL, pH < 7,3, cetonemia positiva.
- D)** Glicemia < 250 mg/dL, pH > 7,5, cetonemia negativa.

Questão 38

FUBOG | GO | 2025

O estágio de Tanner em que a menarca geralmente ocorre é:

- A) M4.
- B) M2.
- C) M3.
- D) M5.

Questão 39

FUBOG | GO | 2025

A estrutura cerebral responsável por respostas às cargas emocionais aos movimentos é:

- A) Córtex pré-frontal.
- B) Área motora cingulada.
- C) Área motora suplementar.
- D) Área pré-motora.

Questão 40

FUBOG | GO | 2025

Um recém-nascido com 28 semanas de idade gestacional e peso ao nascer de 900g é:

- A) Pré-termo moderado e extremo baixo peso ao nascer.
- B) Pré-termo extremo e muito baixo peso ao nascer.
- C) Pré-termo moderado e baixo peso ao nascer.
- D) Pré-termo extremo e extremo baixo peso ao nascer.

Questão 41

FUBOG | GO | 2025

A avaliação da gravidade da pancreatite aguda pode ser feita por diversos critérios. Sobre isso, há as seguintes afirmativas:

- I. A Proteína C Reativa (PCR) acima de 250mg/dl em 48 horas indica alto risco de necrose pancreática.
- II. O balanço hídrico diário é de significativa relevância para a avaliação da gravidade da pancreatite aguda.
- III. Critérios como Sequential Organ Failure Assessment (SOFA), Marshall e Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) II são utilizados para avaliar complicações sistêmicas.

Dessa forma, é CORRETO afirmar:

- A) Apenas II e III estão corretas.
- B) Apenas II está correta.
- C) Apenas III está correta.

D) Apenas I e III estão corretas.

Questão 42

FUBOG | GO | 2025

Paciente, sexo feminino, 35 anos, que após cirurgia abdominal apresenta um abaulamento na região da cicatriz cirúrgica, acompanhado de dor e sensação de peso. O tipo de hérnia mais provável e o principal fator de risco associado são:

- A)** Hérnia umbilical, com obesidade como principal fator de risco.
 - B)** Hérnia de spiegel, com gravidez como principal fator de risco.
 - C)** Hérnia incisional, com infecção do sítio cirúrgico como principal fator de risco.
 - D)** Hérnia epigástrica, com ascite como principal fator de risco.
-

Questão 43

FUBOG | GO | 2025

Paciente de 65 anos, com histórico de fibrilação atrial e hipertensão arterial controlada, comparece à Unidade de Pronto-Atendimento relatando dor abdominal intensa, desproporcional às alterações do exame físico. O diagnóstico mais provável é:

- A)** Abdome agudo inflamatório.
 - B)** Abdome agudo vascular isquêmico.
 - C)** Abdome agudo obstrutivo.
 - D)** Abdome agudo perfurativo.
-

Questão 44

FUBOG | GO | 2025

A pontuação mínima no escore de Alvarado que indica a necessidade de intervenção cirúrgica é:

- A)** 4 pontos.
 - B)** 5 pontos.
 - C)** 7 pontos.
 - D)** 9 pontos.
-

Questão 45

FUBOG | GO | 2025

Com base nos critérios de Tóquio de 2007 e suas atualizações em 2013 e 2018, que sugerem diferentes abordagens para a drenagem biliar e o uso de antibióticos, é CORRETO afirmar:

- A)** A drenagem biliar endoscópica é a primeira opção recomendada pelos critérios de Tóquio de 2007.
- B)** A drenagem biliar percutânea é a primeira opção recomendada pelos critérios de Tóquio

de 2007.

- C)** Os critérios de Tóquio de 2007 recomendam a drenagem biliar aberta como primeira opção.
- D)** Os critérios de Tóquio de 2007 não recomendam o uso de antibióticos.

Questão 46

FUBOG | GO | 2025

Nas cirurgias, o uso de diferentes tipos de fios de sutura é essencial para o fechamento adequado de ferimentos e a aproximação ideal dos bordos. Sobre o assunto, há as seguintes afirmativas:

- I. Os fios monofilamentares são mais suscetíveis a infecções devido ao maior atrito com os tecidos.
- II. Os fios multifilamentares são menos suscetíveis a infecções, mas podem romper durante a manipulação.
- III. A codificação por cor dos fios de sutura é uma prática comum para evitar confusões durante o ato operatório.

Considerando-se as afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F), a alternativa CORRETA é:

- A)** V, V, V.
- B)** F, F, F.
- C)** V, F, F.
- D)** F, F, V.

Questão 47

FUBOG | GO | 2025

Paciente, 62 anos, com diagnóstico prévio de úlcera duodenal, apresenta sangramento ativo em jato durante endoscopia digestiva alta após relatar presença de sangue nas fezes. A classificação para úlcera, de acordo com a classificação de Forrest, e o risco de ressangramento são:

- A)** IIA, 50%.
- B)** IA, 90%.
- C)** IB, 10 - 20%.
- D)** IIB, 25 - 30%.

Questão 48

FUBOG | GO | 2025

Sobre as manifestações extraintestinais da Doença Inflamatória Intestinal (DII), é CORRETO afirmar:

- A)** A má absorção é uma manifestação comum na colite ulcerativa.
- B)** A artrite periférica é independente da atividade da DII.

- C) A colangite esclerosante primária está associada à Doença de Crohn.
- D) A espondilite anquilosante é mais comum em pacientes com antígeno HLA-B27.

Questão 49

FUBOG | GO | 2025

Sobre o esôfago de Barrett, é CORRETO afirmar que:

- A) Ocorre devido à infecção por *Helicobacter pylori* no esôfago.
- B) É uma condição benigna sem risco de malignidade.
- C) É caracterizado pela presença de epitélio colunar especializado no esôfago.
- D) É mais comum em mulheres jovens.

Questão 50

FUBOG | GO | 2025

O método de escolha para confirmação diagnóstica da diverticulite aguda é:

- A) Tomografia Computadorizada (TC) de abdome e pelve.
- B) Ultrassonografia (USG) de abdome.
- C) Colonoscopia.
- D) Radiografia simples de abdome.

Questão 51

FUBOG | GO | 2025

Durante o período pós-operatório, é essencial monitorar diversas condições do paciente, tais como:

- I. A hidratação e o balanço hídrico do paciente devem ser analisados diariamente.
- II. A movimentação precoce do paciente é recomendada para prevenir o acúmulo de secreções.
- III. A dor pós-operatória é mais intensa após 72 horas do procedimento.

Dessa forma, é CORRETO afirmar:

- A) Apenas II está correta.
- B) Apenas I e II estão corretas.
- C) Apenas III está correta.
- D) Apenas II e III estão corretas.

Questão 52

FUBOG | GO | 2025

A American Society of Anesthesiology (ASA) mais apropriada para uma criança de 8 anos com asma exacerbada e obesidade mórbida, que está sendo avaliada para uma cirurgia de

apendicectomia, é:

- A) ASA 4.
- B) ASA 2.
- C) ASA 1.
- D) ASA 3.

Questão 53

FUBOG | GO | 2025


Paciente, 35 anos, que chega ao pronto-socorro após um acidente de carro, com dificuldade respiratória e sinais de enfisema subcutâneo. Nesse caso, a conduta inicial para garantir a via aérea pérvia é:

- A) Realizar intubação orotraqueal imediatamente.
- B) Realizar manobra de Jaw Thrust e aspirar secreções.
- C) Administrar ventilação mecânica invasiva.
- D) Aplicar máscara não reinalante de O₂ e observar.

Questão 54

FUBOG | GO | 2025

A imagem a seguir mostra uma área (b) anatômica denominada de “trígono lombar inferior”, cuja delimitação se dá pela crista íliaca, músculo oblíquo externo e músculo latíssimo do dorso. Quando há uma fragilidade nessa região, em raros casos, pode-se surgir uma hérnia. A hérnia que se localiza nessa região é conhecida como:



- A) Hérnia de Spiegel.
- B) Hérnia de Grynfeldt.
- C) Hérnia de Petit.
- D) Hérnia de Petersen.

Questão 55

FUBOG | GO | 2025

Entre as opções a seguir, o fator de risco para o desenvolvimento da Doença de Crohn é:

- A)** Tabagismo.
- B)** Apendicectomia.
- C)** Uso de Anti-Inflamatórios Não Esteroides (AINEs).
- D)** Contraceptivos orais.

Questão 56

FUBOG | GO | 2025

A gastrectomia vertical, também conhecida como cirurgia de Sleeve, é uma técnica bariátrica que transforma o estômago em um tubo. Sobre o assunto, há as seguintes afirmativas:

- I. A gastrectomia vertical é considerada uma técnica cirúrgica puramente restritiva.
- II. A gastrectomia vertical não apresenta eficácia significativa no controle da hipertensão.
- III. A capacidade do estômago após a gastrectomia vertical é de 80 a 100 mililitros.

Considerando-se as afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F), a alternativa CORRETA é:

- A)** V, F, F.
- B)** V, V, V.
- C)** F, F, F.
- D)** F, F, V.

Questão 57

FUBOG | GO | 2025

Sobre a anatomia do reto e canal anal, é CORRETO afirmar:

- A)** O esfíncter externo é composto por fibras lisas involuntárias.
- B)** A linha pectínea delimita a divisão entre o epitélio colunar simples proximal e o epitélio estratificado distal.
- C)** O epitélio colunar simples é encontrado distalmente à linha pectínea.
- D)** O plexo venoso superior é responsável pela drenagem sanguínea do canal anal.

Questão 58

FUBOG | GO | 2025

Fissuras anais são pequenas rupturas ou cortes no revestimento do canal anal, frequentemente causadas por trauma durante a evacuação, constipação ou diarreia. Elas podem causar dor intensa, sangramento e desconforto durante as evacuações. O tratamento das fissuras anais varia conforme a gravidade e a duração dos sintomas, podendo incluir medidas conservadoras ou intervenções cirúrgicas. Sobre o tratamento das fissuras anais, é CORRETO afirmar:

- A)** Vasodilatadores tópicos são contraindicados no tratamento de fissuras anais.
- B)** Fissuras anais agudas devem ser tratadas exclusivamente com cirurgia.
- C)** O tratamento conservador inclui medidas como consumo de fibras e banhos de assento.

D) Fissuras anais crônicas não requerem tratamento da patologia base.

Questão 59

FUBOG | GO | 2025

Paciente, 45 anos, com histórico de uso crônico de Anti-Inflamatórios Não Esteroides (AINEs), que apresenta dor epigástrica intensa piorando após as refeições e com endoscopia revelando uma úlcera gástrica. Nesse caso, o tratamento mais indicado é:

- A)** Omeprazol 20 mg de 12/12 horas por 14 dias, Amoxicilina 500 mg de 12/12 horas por 14 dias, Claritromicina 250 mg de 12/12 horas por 14 dias.
 - B)** Omeprazol 20 mg de 12/12 horas por 14 dias, Metronidazol 500 mg de 12/12 horas por 14 dias, Claritromicina 500 mg de 12/12 horas por 14 dias.
 - C)** Omeprazol 20 mg de 12/12 horas por 14 dias, Amoxicilina 1000 mg de 12/12 horas por 7 dias, Claritromicina 500 mg de 12/12 horas por 7 dias.
 - D)** Omeprazol 20 mg de 12/12 horas por 14 dias, Amoxicilina 1000 mg de 12/12 horas por 14 dias, Claritromicina 500 mg de 12/12 horas por 14 dias.
-

Questão 60

FUBOG | GO | 2025

Paciente, 10 anos, com uma laceração na face causada por uma queda há 20 horas, sem sinais de infecção e com a ferida limpa. Nesse caso, a melhor abordagem para sutura é:

- A)** Realizar a sutura imediatamente, pois a face tolera um prazo maior de até 24 horas.
 - B)** Não realizar a sutura devido ao tempo decorrido, optando por curativos secundários.
 - C)** Realizar a sutura apenas após a administração de profilaxia antitetânica.
 - D)** Contraindicar a sutura e iniciar antibioticoterapia profilática, aguardando sinais de infecção.
-

Questão 61

FUBOG | GO | 2025

As vulvovaginites e vaginoses representam queixas frequentes nos consultórios de ginecologia. Sobre o assunto, há as seguintes afirmativas:

- I. A vaginose citolítica é causada pela proliferação excessiva de *Lactobacillus* e pela redução do pH vaginal.
- II. A vaginite inflamatória descamativa é uma forma comum de vaginite purulenta crônica.
- III. A vaginite aeróbica é caracterizada pela presença de bactérias aeróbicas entéricas e redução de *Lactobacillus*.

Dessa forma, é CORRETO afirmar:

- A)** Apenas III está correta.
- B)** Apenas II está correta.
- C)** Apenas I e III estão corretas.

D) Apenas II e III estão corretas.

Questão 62

FUBOG | GO | 2025

Paciente, sexo feminino, gestante de 32 semanas, chega ao pronto-socorro com sangramento vaginal moderado e dor abdominal intensa. Após diagnóstico de descolamento prematuro de placenta, a conduta mais adequada para o caso é:

- A)** Realizar amniotomia e monitorar a paciente.
 - B)** Realizar cesárea de emergência.
 - C)** Administrar ocitocina para induzir o parto.
 - D)** Aguardar o parto vaginal espontâneo.
-

Questão 63

FUBOG | GO | 2025

Paciente, sexo feminino, 28 anos, apresenta teste de HPV positivo e citologia com ASC-US. A abordagem mais adequada para esse caso é:

- A)** Iniciar tratamento excisional sem biópsia confirmatória.
 - B)** Repetir o teste de HPV após um ano.
 - C)** Realizar biópsia endocervical.
 - D)** Encaminhar para colposcopia imediata.
-

Questão 64

FUBOG | GO | 2025

Paciente, sexo feminino, 30 anos, com histórico de múltiplos parceiros sexuais, apresenta lesões papilares na região anogenital. O método diagnóstico mais adequado para confirmar a presença de condiloma é:

- A)** Vulvoscopia com aplicação de ácido acético.
 - B)** Teste de Schiller.
 - C)** Biópsia excisional.
 - D)** PCR para identificação do tipo viral.
-

Questão 65

FUBOG | GO | 2025

Paciente, sexo feminino, 45 anos, imunocomprometida, apresenta prurido vulvar, dispareunia e corrimento vaginal branco, com relato de cinco episódios semelhantes no último ano. O tratamento mais adequado para esta paciente é:

- A)** Tópico com nistatina creme por 14 dias.
- B)** Tópico com miconazol creme a 2% por 7 dias.

- C) Oral com fluconazol 150 mg, dose única.
 - D) Oral com fluconazol em esquema prolongado.
-

Questão 66

FUBOG | GO | 2025

A interpretação da Cardiotografia (CTG) anteparto requer critérios bem estabelecidos para avaliar a condição fetal, incluindo a variabilidade da Frequência Cardíaca Fetal (FCF) e a presença de acelerações e desacelerações. Sobre o assunto, há as seguintes afirmativas:

- I. A variabilidade da FCF basal é considerada moderada quando a amplitude é de 6 a 25 bpm.
- II. Desacelerações tardias são caracterizadas por uma queda abrupta da FCF com nadir ≥ 15 bpm e duração ≥ 15 segundos.
- III. A presença de acelerações transitórias da FCF é um indicador de reatividade fetal.

Considerando-se as afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F), a alternativa CORRETA é:

- A) V, V, F.
 - B) V, F, V.
 - C) V, V, V.
 - D) F, V, V.
-

Questão 67

FUBOG | GO | 2025

Paciente, sexo feminino, com 28 semanas de gestação, apresentando sangramento vaginal moderado, hipertonia uterina significativa, aumento da frequência cardíaca e alteração da vitalidade fetal com feto vivo. O grau mais provável de descolamento prematuro de placenta é:

- A) Grau III A.
 - B) Grau I.
 - C) Grau II.
 - D) Grau III B.
-

Questão 68

FUBOG | GO | 2025

Paciente, sexo feminino, 32 anos, gestante com histórico de duas cesarianas anteriores e placenta de implantação anterior baixa. A conduta recomendada para o diagnóstico e planejamento do parto é:

- A) Realizar a avaliação ultrassonográfica apenas no terceiro trimestre.
 - B) Realizar a avaliação ultrassonográfica entre 18 e 24 semanas de gestação.
 - C) Planejar o parto para 37 semanas de gestação.
 - D) Evitar o uso de corticosteroides antenatais.
-

Questão 69

FUBOG | GO | 2025

A abordagem cirúrgica recomendada para casos de Sangramento Uterino Anormal (SUA) causado por miomas submucosos é:

- A) Miomectomia histeroscópica.
- B) Miomectomia laparotômica.
- C) Histerectomia.
- D) Embolização da artéria uterina.

Questão 70

FUBOG | GO | 2025

A principal função da progesterona durante a fase lútea do ciclo menstrual é:

- A) Manter o corpo lúteo.
- B) Organizar as glândulas endometriais e cessar as mitoses.
- C) Promover a proliferação do endométrio.
- D) Estimular a secreção de FSH.

Questão 71

FUBOG | GO | 2025

A densidade mamária é um fator que pode influenciar a eficácia dos métodos de rastreamento do câncer de mama. Sobre o assunto, há as seguintes afirmativas:

- I. A mamografia tem baixa sensibilidade em mamas densas.
- II. A ressonância magnética é recomendada anualmente para mulheres de alto risco.
- III. A tomossíntese mamária não deve ser utilizada em locais onde está disponível.

Dessa forma, é CORRETO afirmar:

- A) Apenas II está correta.
- B) Apenas II e III estão corretas.
- C) Apenas III está correta.
- D) Apenas I e II estão corretas.

Questão 72

FUBOG | GO | 2025

De acordo com os critérios clínicos de elegibilidade para métodos contraceptivos segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é CORRETO afirmar:

- A) Categoria 1: O método pode ser usado sem restrições.
- B) Categoria 2: O método é contraindicado.
- C) Categoria 3: O método pode ser usado com restrições, desde que as vantagens superem os riscos.

- D)** Categoria 4: O método pode ser utilizado, no entanto, deve ser a última escolha disponível.
-

Questão 73

FUBOG | GO | 2025

O tratamento padrão de primeira linha mais indicado para câncer de ovário avançado é:

- A)** Uso exclusivo de quimioterapia intraperitoneal.
 - B)** Quimioterapia neoadjuvante seguida de radioterapia.
 - C)** Cirurgia citorrredutora seguida de quimioterapia com carboplatina e paclitaxel.
 - D)** Tratamento com imunoterapia e radioterapia.
-

Questão 74

FUBOG | GO | 2025

Paciente, 45 anos, com queixa de perda urinária ao esforço e sem histórico de cirurgias pélvicas. A conduta mais adequada em relação ao uso do Estudo Urodinâmico (EUD) na abordagem da Incontinência Urinária (IU) feminina é:

- A)** Solicitar o EUD para todos os casos de IU, a fim de definir a melhor conduta.
 - B)** Solicitar o EUD antes do tratamento conservador da IU.
 - C)** Não solicitar o EUD antes do tratamento conservador da IU.
 - D)** Solicitar o EUD apenas se houver suspeita de disfunção do esvaziamento vesical.
-

Questão 75

FUBOG | GO | 2025

Paciente, sexo feminino, 16 anos, apresenta ausência de menstruação, dor pélvica cíclica e caracteres sexuais secundários desenvolvidos. O diagnóstico mais provável é:

- A)** Síndrome dos ovários policísticos.
 - B)** Criptomenorreia devido a hímen imperfurado.
 - C)** Síndrome de Turner.
 - D)** Amenorreia hipotalâmica funcional.
-

Questão 76

FUBOG | GO | 2025

A toxoplasmose congênita pode causar sérias complicações fetais. Sobre o rastreamento e tratamento da toxoplasmose durante a gravidez, há as seguintes afirmativas:

- I. A pesquisa de toxoplasmose é obrigatória no Brasil.
- II. O tratamento da toxoplasmose iniciado nas primeiras três semanas de soroconversão reduz a transmissão entre mãe e o feto.
- III. Não há evidências de que o tratamento da toxoplasmose durante a gravidez melhora os

resultados neonatais.

Considerando-se as afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F), a alternativa CORRETA é:

- A) F, V, V.
- B) V, V, V.
- C) V, F, F.
- D) F, F, F.

Questão 77

FUBOG | GO | 2025

Sobre os regimes de uso dos Contraceptivos Orais Combinados (COCs), é CORRETO afirmar:

- A) O regime estendido consiste no uso de 28 comprimidos ativos seguidos por 7 dias de pausa.
- B) O regime contínuo consiste no uso de 21 comprimidos seguidos por 7 dias de pausa.
- C) O regime-padrão consiste no uso de 24 comprimidos ativos seguidos por 4 dias de placebo.
- D) O regime estendido flexível permite o uso de até 120 dias sem intervalos, com pausas opcionais de 4 dias.

Questão 78

FUBOG | GO | 2025

As alternativas, que estão de acordo com as contraindicações absolutas (categoria 4) para o uso de anticoncepcionais orais combinados, segundo a OMS, são:

- A) Hepatite viral aguda e deficiência de proteína C.
- B) Hipertensão controlada com medicação.
- C) Diabetes mellitus sem complicações vasculares.
- D) Tabagismo em mulheres com menos de 35 anos.

Questão 79

FUBOG | GO | 2025

A vacina contra o HPV disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) e os tipos de HPV que ela previne são:

- A) Nonavalente, previne HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58.
- B) Bivalente, previne HPV 16 e 18.
- C) Quadrivalente, previne HPV 6, 11, 16 e 18.
- D) Trivalente, previne HPV 6, 11 e 16.

Questão 80

FUBOG | GO | 2025

Sobre o tratamento da gravidez ectópica, é CORRETO afirmar:

- A)** A salpingostomia é indicada em pacientes com Beta-HCG superior a 5.000 mUI/mL.
- B)** A salpingectomia é indicada para pacientes que desejam preservar a fertilidade.
- C)** A laparotomia é indicada em casos de gravidez ectópica sem instabilidade hemodinâmica.
- D)** O tratamento com Metotrexato (MTX) é contraindicado em casos de embrião vivo.

Questão 81

FUBOG | GO | 2025

Os estudos epidemiológicos podem ser classificados de acordo com a intervenção do investigador e o propósito do estudo. Sobre o assunto, há as seguintes afirmativas:

- I. Estudos ecológicos focam em grupos de pessoas e utilizam áreas geográficas como unidade de estudo.
- II. Ensaios clínicos são estudos retrospectivos que visam avaliar a eficácia de intervenções terapêuticas.
- III. Estudos longitudinais podem ser prospectivos ou retrospectivos e têm como objetivo analisar a incidência de casos ao longo do tempo.

Dessa forma, é CORRETO afirmar:

- A)** Apenas II e III estão corretas.
- B)** Apenas I e III estão corretas.
- C)** Apenas III está correta.
- D)** Apenas II está correta.

Questão 82

FUBOG | GO | 2025

A relação entre sensibilidade e especificidade é:

- A)** Um teste com alta especificidade pode possuir baixa sensibilidade.
- B)** Um teste altamente sensível geralmente possui alta especificidade.
- C)** A sensibilidade e especificidade de um teste aumentam com a prevalência da doença.
- D)** A especificidade de um teste é dependente da prevalência da doença.

Questão 83

FUBOG | GO | 2025

O conceito de Sistema Epidemiológico no modelo sistêmico de epidemiologia é:

- A)** Conjunto formado por agente, suscetível e pelo meio ambiente, dotado de uma organização interna que regula as interações determinantes da produção de doença.
- B)** Conjunto de processos interativos que cria o estímulo patológico no meio ambiente.
- C)** Conjunto de elementos de tal forma relacionados que uma mudança de qualquer elemento provoca mudança no estado dos demais elementos.

- D)** Conjunto de fatores que perturbam o ser diretamente em suas funções vitais produzindo a doença.
-

Questão 84

FUBOG | GO | 2025

Sobre a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) na Constituição Federal de 1988, é CORRETO afirmar que:

- A)** Foi criado exclusivamente para atender trabalhadores formais e seus dependentes.
 - B)** Foi criado para substituir o Sistema Nacional de Previdência Social (SINPAS).
 - C)** Foi criado com base nos princípios de universalização, equidade e descentralização.
 - D)** Foi criado para centralizar todas as ações de saúde no âmbito federal.
-

Questão 85

FUBOG | GO | 2025

Sobre as competências do SUS, conforme estabelecido na Constituição e na Lei nº 8.080, é CORRETO afirmar:

- A)** Não participa da formulação de políticas de saneamento básico, que são governadas pelo sistema nacional de saneamento básico.
 - B)** Não tem competência para executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, pois essas ações são integradas à saúde, porém executadas pela Anvisa.
 - C)** É responsável apenas pela assistência terapêutica integral, sem incluir a saúde do trabalhador, que deve ser de competência do Ministério do Trabalho.
 - D)** É responsável por controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, além de contribuir para a produção de medicamentos.
-

Questão 86

FUBOG | GO | 2025

A Declaração de Óbito (DO) é um documento padronizado e de uso obrigatório em todo o território nacional. Sobre o assunto, há as seguintes afirmativas:

- I. A DO deve ser emitida pelo cartório de registro civil.
- II. A via amarela da DO deve ser arquivada no prontuário do paciente.
- III. A DO foi atualizada pela última vez em 2014.

Considerando-se as afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F), a alternativa CORRETA é:

- A)** V, V, V.
 - B)** F, F, V.
 - C)** V, F, F.
 - D)** F, F, F.
-

Questão 87

FUBOG | GO | 2025

Paciente, sexo feminino, 14 anos, procura a Unidade Básica de Saúde (UBS) para consulta de rotina. No momento da consulta, está desacompanhada e menciona que quer começar a usar anticoncepcional, pois pretende ter relações sexuais com o namorado, de 18 anos. No que diz respeito à conduta médica, a abordagem mais adequada é:

- A)** Explicar para a paciente que ela deve trazer seus pais ou responsáveis para uma nova consulta, pois eles devem estar cientes e autorizar a prescrição do anticoncepcional.
- B)** Solicitar que os responsáveis compareçam em consulta para orientação e autorização da prescrição da pílula, pois por se tratar de uma adolescente, essa decisão deve ser compartilhada com os responsáveis.
- C)** Orientar a paciente sobre o uso de preservativos, que não devem ser dispensados mesmo com o uso do anticoncepcional, fornecer instruções sobre o uso correto da pílula e prescrever, conforme solicitado, sem necessidade de contatar os pais.
- D)** Prescrever a pílula, desde que ela se comprometa a trazer um termo de consentimento assinado pelos pais ou responsáveis, e se comprometa a comparecer a cada 30 dias em consulta.

Questão 88

FUBOG | GO | 2025

Sobre a Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA), é CORRETO afirmar:

- A)** Foi instituída em 1996 por iniciativa conjunta do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).
- B)** É uma iniciativa exclusiva do Ministério da Saúde, sem participação de outras instituições.
- C)** Foi criada em 2002 com o objetivo de melhorar a coleta de dados de saúde em áreas urbanas.
- D)** É responsável pela coleta e análise de dados de mortalidade no Brasil.

Questão 89

FUBOG | GO | 2025

Paciente, 45 anos, portador de HIV, é acompanhado por Unidade Básica de Saúde (UBS), relata que não contou à família, pois “não quer preocupar ninguém”. Tempos depois, o agente de saúde comunica que ele está internado por pneumonia em um hospital de referência. A mãe comparece à UBS solicitando uma cópia do prontuário, pois deseja levá-lo ao hospital para que a equipe conheça os antecedentes pessoais do paciente. A conduta apropriada para o caso é:

- A)** Não fornecer uma cópia do prontuário, salvo em caso de óbito do paciente.
- B)** Fornecer uma cópia do prontuário se houver solicitação do hospital.
- C)** Não fornecer uma cópia do prontuário sem autorização do paciente.
- D)** Fornecer uma cópia do prontuário desde que a mãe tenha uma procuração.

Questão 90

FUBOG | GO | 2025

Sobre o principal objetivo da prevenção quinquenária, é CORRETO afirmar:

- A)** Promover a educação alimentar e a prática de atividade física.
- B)** Diagnosticar precocemente doenças em estágio inicial.
- C)** Reduzir complicações de doenças crônicas.
- D)** Melhorar a qualidade dos cuidados prestados ao paciente, focando no cuidador.

Questão 91

FUBOG | GO | 2025

A atenção secundária à saúde envolve profissionais mais específicos e maior demanda tecnológica, sendo responsável por casos de complexidade intermediária. Sobre o assunto, há as seguintes afirmativas:

- I. Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) representam um exemplo de atuação da atenção secundária.
- II. A atenção secundária é caracterizada pelo uso de tecnologias avançadas e procedimentos invasivos.
- III. Serviços de urgência e emergência são comumente utilizados na atenção secundária.

Dessa forma, é CORRETO afirmar:

- A)** Apenas I e III estão corretas.
- B)** Apenas II está correta.
- C)** Apenas III está correta.
- D)** Apenas II e III estão corretas.

Questão 92

FUBOG | GO | 2025

O papel do Ministério da Saúde e do Sistema Único de Saúde (SUS) na saúde do trabalhador é:

- A)** Coordenar a utilização de agrotóxicos e a educação ambiental.
- B)** Realizar a inspeção e fiscalização das condições e dos ambientes de trabalho.
- C)** Responsabilizar-se pela perícia médica, reabilitação profissional e pagamento de benefícios.
- D)** Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, assim como de saúde do trabalhador.

Questão 93

FUBOG | GO | 2025

O modelo explicativo do processo saúde-doença predominante na atualidade que é criticado

por sua visão fragmentária e mecanicista é:

- A)** Modelo holístico.
- B)** Modelo biomédico.
- C)** Modelo dinâmico.
- D)** Modelo da História natural das doenças.

Questão 94

FUBOG | GO | 2025

Com relação à importância da atualização da lista nacional de agravos de notificação compulsória pela Portaria GM/MS Nº 217/2023, é CORRETO afirmar que:

- A)** Elimina a necessidade de monitoramento de epizootias.
- B)** Reduz a necessidade de notificação de novos agravos.
- C)** Limita a notificação apenas a doenças de causa conhecida.
- D)** Garante a vigilância contínua e atualizada de eventos que possam ameaçar a saúde pública.

Questão 95

FUBOG | GO | 2025

Sobre a transição epidemiológica no Brasil, é CORRETO afirmar:

- A)** A expectativa de vida ao nascer no Brasil diminuiu de 45,5 anos em 1940 para 76 anos em 2017.
- B)** A taxa geral de mortalidade no Brasil aumentou de 18/1000 em 1940 para 6/1000 em 2015.
- C)** Nos últimos 60 anos, o Brasil passou de um perfil de alta mortalidade por doenças infecciosas para predominância de óbitos por doenças cardiovasculares e outras crônico-degenerativas.
- D)** As doenças infecciosas e parasitárias representavam 5,9% do total de óbitos em 1930.

Questão 96

FUBOG | GO | 2025

A estimativa da Idade Gestacional (IG) é um passo crucial na primeira consulta de pré-natal. Sobre o assunto, há as seguintes afirmativas:

- I. A idade gestacional é estimada com base na Data da Última Menstruação (DUM) e confirmada por ultrassonografia no segundo trimestre.
- II. A regra de Naegele é utilizada para calcular a data provável do parto, somando 7 dias à DUM e subtraindo dois meses.
- III. Ciclos menstruais irregulares podem contribuir para erros na estimativa da DUM.

Considerando-se as afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F), a alternativa CORRETA é:

- A)** F, F, V.

- B)** V, V, V.
 - C)** V, F, F.
 - D)** F, F, F.
-

Questão 97

FUBOG | GO | 2025

Sobre a sensibilidade e especificidade nos testes diagnósticos, é CORRETO afirmar:

- A)** A especificidade de um teste é a probabilidade de dar positivo na presença da doença.
 - B)** A especificidade de um teste é a probabilidade de dar positivo na ausência da doença.
 - C)** A sensibilidade de um teste é a probabilidade de dar negativo na presença da doença.
 - D)** A sensibilidade de um teste é a probabilidade de dar positivo na presença da doença.
-

Questão 98

FUBOG | GO | 2025

Sobre os princípios e diretrizes da Atenção Básica no SUS, é CORRETO afirmar:

- A)** Deve ser integral, mas pode limitar o acesso a determinados grupos populacionais.
 - B)** Deve ser universal, mas pode priorizar e supervalorizar pessoas com condições socioeconômicas desfavoráveis.
 - C)** Deve ser universal, equitativa e integral, garantindo acesso a todos os serviços de saúde de forma contínua e resolutiva.
 - D)** Deve ser equitativa, mas não precisa garantir a integralidade dos serviços de saúde, pois isso é de competência das Redes de Atenção a Saúde (RAS).
-

Questão 99

FUBOG | GO | 2025

Com relação ao período de incubação e transmissibilidade dos arbovírus, é CORRETO afirmar que:

- A)** O período de incubação intrínseco do vírus Zika (ZIKV) é de 8 a 14 dias.
 - B)** O período de viremia do vírus Chikungunya (CHIKV) no homem pode durar até 10 dias.
 - C)** O período de incubação extrínseco do vírus Dengue (DENV) é de 1 a 12 dias.
 - D)** O período de viremia do vírus Zika (ZIKV) no homem se estende até o décimo dia do início dos sintomas.
-

Questão 100

FUBOG | GO | 2025

Paciente, 35 anos, que recentemente voltou de uma viagem à Amazônia, apresenta febre alta, calafrios, sudorese intensa e cefaleia. Após exame de sangue, foi diagnosticado com malária. A espécie de Plasmodium mais provável pela infecção é:

- A)** Plasmodium vivax.
- B)** Plasmodium malariae.
- C)** Plasmodium ovale.
- D)** Plasmodium falciparum.