



CERMAN

2025 | AM | 100 Questões



Questão 1

CERMAN | AM | 2025

Uma paciente de 30 anos, previamente saudável e assintomática, apresenta TSH elevado e T4 livre normal. Ao exame físico, não há sinais de bócio. Qual é a conduta mais apropriada neste caso?

- A) Iniciar levotiroxina.
- B) Realizar cintilografia da tireoide.
- C) Repetir o TSH, T4 livre e anticorpo anti tireoperoxidase em 3 a 6 meses.
- D) Dosar tireoglobulina, anti-tireoglobulina e anti tireoperoxidase para esclarecer a etiologia.

Questão 2

CERMAN | AM | 2025

Com base nas recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2024, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA:

- A) Glicemia de jejum, HbA1c e TTGO são os primeiros testes de rastreamento de DM2.
- B) É recomendado utilizar como ponto de corte de glicemia no teste de tolerância à glicose oral (TTGO) de 1h ≥ 209 mg/dl para diagnóstico de DM2 e ≥ 155 mg/dl para detecção de pré diabetes.
- C) O teste de tolerância à glicose oral (TTGO) com glicemia de 1h ≥ 200 mg/dL é recomendado para diagnóstico de diabetes mellitus e é superior ao teste de tolerância à glicose oral (TTGO) de 2h em termos de praticidade e desempenho.
- D) Para diagnóstico de diabetes mellitus, é suficiente a presença de glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL em apenas uma amostra de sangue, sem necessidade de confirmação, na presença de sintomas típicos de hiperglicemia.

Questão 3

CERMAN | AM | 2025

Paciente de 55 anos, sexo feminino, relata que há cerca de 6 meses tem a firme convicção de que está sendo secretamente monitorada por seus vizinhos, que, segundo ela, instalaram câmeras em sua casa para espionar todos os seus movimentos. Ela acredita que os vizinhos comentam sobre ela e discutem suas atividades diárias. Apesar de diversas evidências que refutam essa ideia, a paciente mantém sua crença inabalável. Ela nega ter qualquer alucinação auditiva ou visual e, fora do conteúdo do delírio, consegue manter uma vida funcional: trabalha normalmente como secretária, cuida de sua casa, e interage com familiares sem dificuldades. Não há histórico de transtorno de humor grave ou sintomas psicóticos que não sejam relacionados a esse tema específico. A paciente também nega o uso de substâncias ou outras condições médicas que possam justificar seus sintomas. Qual é o diagnóstico mais provável para este caso, de acordo com o DSM-V-TR?

- A) Esquizofrenia
- B) Transtorno delirante
- C) Transtorno esquizoafetivo
- D) Transtorno de personalidade esquizotípica

Questão 4

CERMAN | AM | 2025

A Hanseníase é uma doença infecciosa de evolução crônica que, embora seja curável, permanece endêmica no Brasil e representa um problema de saúde pública de grande magnitude. Em relação à Hanseníase, assinale a alternativa CORRETA:

- A)** A principal fonte de infecção é o contato de um indivíduo suscetível com a pele infectada de indivíduos acometidos pela hanseníase e com alta carga bacilar.
- B)** As reações hansênicas são fenômenos inflamatórios agudos que ocorrem em indivíduos não tratados e com alta carga bacilar por ação direta do bacilo no endotélio vascular.
- C)** O bacilo de Hansen afeta primariamente os nervos periféricos e a pele, porém em indivíduos com baixa grau de resistência imune ao bacilo, a doença pode acometer a mucosa do trato respiratório superior, olhos, linfonodos, testículos e sistema retículo-endotelial.
- D)** A hanseníase indeterminada é aquela que se encontra entre os polos tuberculoide e virchowiano no espectro clínico e baciloscópico da doença, apresentando características imunológicas mistas e lesões polimórficas que vão desde placas bem delimitadas até infiltração difusa.

Questão 5

CERMAN | AM | 2025

Um homem de 62 anos, advogado, com hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2 e dislipidemia, começou a apresentar fraqueza muscular progressiva nos membros superiores, especialmente nas mãos, com dificuldade para segurar objetos e realizar tarefas manuais finas. Além disso, desenvolveu espasmos musculares e fasciculações visíveis nos braços. O paciente relatou também perda de peso. Nos últimos meses, progrediu para membros inferiores, comprometendo sua capacidade de caminhar. Durante o exame neurológico, foram observados reflexos tendinosos exacerbados, sinal de Babinski bilateral e atrofia muscular. A função sensitiva estava preservada. Com base nesse quadro clínico, qual o diagnóstico?

- A)** Esclerose múltipla
- B)** Polineuropatia diabética
- C)** Síndrome de Guillain-Barré
- D)** Esclerose lateral amiotrófica (ELA)

Questão 6

CERMAN | AM | 2025

Uma mulher de 29 anos, advogada, procura atendimento médico devido a episódios recorrentes de fraqueza e formigamento no lado direito do corpo que duram algumas semanas e depois melhoram parcialmente. Ela relata que há cerca de seis meses teve um episódio de perda temporária da visão no olho esquerdo, que foi diagnosticado como neurite óptica e também se resolveu parcialmente. Nos últimos dias, passou a ter dificuldade para caminhar devido à fraqueza na perna direita e desequilíbrio, especialmente ao fazer movimentos rápidos. Durante o exame neurológico, foram observados nistagmo ao desviar o olhar para os lados, sinal de Babinski no lado direito, espasticidade com hiperreflexia em ambos os membros inferiores. A paciente recebeu o diagnóstico de Esclerose Múltipla após a

realização de uma ressonância magnética (RM) que revelou lesões em múltiplas áreas da substância branca do cérebro e da medula espinhal. Qual a patogênese da Esclerose Múltipla?

- A)** Envolve uma complexa interação entre fatores imunológicos, genéticos e ambientais.
- B)** Autoanticorpos contra aquaporina-4, levando a inflamação e dano aos astrócitos.
- C)** Deposição de placas de beta-amiloide e emaranhados neurofibrilares.
- D)** Presença de autoanticorpos anti-GQ1b que atacam os oligodendrócitos.

Questão 7

CERMAN | AM | 2025

Paciente com cirrose hepática por álcool, Child Pugh A e sem comorbidades, chega ao ambulatório com ultrassonografia de abdome apresentando um nódulo irregular medindo 3,0cm, em seu maior eixo, no seguimento VIII. Foi realizada tomografia de abdome com contraste dinâmico que evidenciou padrão de “wash out” no nódulo. Não se observam sinais de invasão vascular ou linfonodos. Estudos de estadiamento não apresentaram evidências de metástases. Qual a conduta mais adequada?

- A)** Repetir a tomografia com contraste em 3 meses para avaliar se haverá aumento do nódulo.
- B)** Encaminhar para ablação percutânea por radiofrequência.
- C)** Encaminhar para quimioembolização arterial.
- D)** Iniciar tratamento com sorafenib.

Questão 8

CERMAN | AM | 2025

Um paciente de 35 anos de idade, advogado, previamente hígido, foi atendido no serviço de endoscopia de urgência por disfagia aguda devido a impactação de carne. Qual o diagnóstico mais provável?

- A)** Estenose péptica
- B)** Acalasia chagásica
- C)** Esofagite eosinofílica
- D)** Esôfago em quebra-nozes

Questão 9

CERMAN | AM | 2025

Mulher de 25 anos portadora de valvulopatia mitral vem evoluindo com febre há 3 meses e ao procurar seu médico assistente o mesmo suspeita de um quadro de Endocardite Infecciosa. Em relação aos critérios de Duke modificado é correto afirmar EXCETO:

- A)** Para os micro-organismos típicos e atípicos, são necessárias duas hemoculturas, com intervalos de 12 h entre elas para serem coletadas.
- B)** O ecocardiograma continua sendo o exame de escolha e um critério maior. Pode apresentar como alterações a vegetação ou as complicações da EI, como perfuração ou pseudoaneurisma de folhetos, abscesso, pseudoaneurisma ou fístula paravalvares ou

deiscência de prótese valvar.

- C)** Para os micro-organismos típicos, são necessárias duas hemoculturas positivas e para os atípicos três hemoculturas, que não necessitam mais de longos intervalos entre elas para serem coletadas.
- D)** São incluídos nos critérios menores a evidência clínica ou radiológica de embolia arterial, infarto pulmonar, abscesso cerebral ou esplênico, aneurisma micótico, hemorragia intracraniana, hemorragia conjuntival, lesões de Janeway, púrpura purulenta.

Questão 10

CERMAN | AM | 2025

Sobre a Síndrome do choque tóxico estreptocócico, pode-se afirmar, à EXCEÇÃO de uma:

- A)** A duração do tratamento dos pacientes com bacteremia deve ser de pelo menos 14 dias.
- B)** A terapia empírica para tratamento desta Síndrome deve incluir o seguinte regime de antibioticoterapia: clindamicina + vancomicina associado a um carbapenêmico ou piperacilina - tazobactan.
- C)** A mortalidade devido à Síndrome do choque tóxico estreptocócico é substancialmente menor do que a mortalidade devido à Síndrome do choque tóxico estafilocócico.
- D)** Uma das terapias adjuvantes é o uso de Imunoglobulina Intravenosa por 03 dias e vários mecanismos foram sugeridos para esta intervenção: a opsonização de estreptococos do grupo A, a neutralização de toxinas estreptocócicas, a inibição da proliferação de células T e a inibição de citocinas inflamatórias, como TNF-alfa e interleucina 6.

Questão 11

CERMAN | AM | 2025

Paciente, sexo masculino, 35 anos de idade, vítima de acidente motociclístico (queda da moto após colisão contra um poste), cursou com traumatismo cranioencefálico e torácico. Adentra na Emergência pronunciando sons incompreensíveis, localizando dor aos estímulos dolorosos, porém sem abertura ocular. Taquidispnéico, diaforético, apresentava estase de jugulares a 45º, murmúrio vesicular abolido à esquerda, com hipertimpanismo à percussão ipsilateral. À rápida inspeção, observava-se lesão contusa em couro cabeludo, com sangramento ativo e queda da língua, com grande esforço respiratório. Mucosas descoradas 3+/4+. Dados vitais à admissão, PA=70X40mmHg, pulso=140bpm, FR=40irpm. Em relação ao estado de choque desse paciente, pode-se afirmar que mais provavelmente se trata de choque:

- A)** misto: cardiogênico e hipovolêmico
- B)** misto: obstrutivo e hipovolêmico
- C)** hipovolêmico apenas
- D)** neurogênico apenas

Questão 12

CERMAN | AM | 2025

Na esclerose sistêmica é considerado fator de risco para acometimento renal; assinale a alternativa CORRETA:

- A) Sexo masculino.
- B) Forma limitada da doença.
- C) Uso prévio de corticoesteróide.
- D) Início da doença na pós menopausa.

Questão 13

CERMAN | AM | 2025

Paciente de 64 anos, obesa, após esforço físico intenso apresenta dor lombar com irradiação para a região posterior de coxa direita, joelho, perna e planta do pé direito. Sente formigamentos e choques quando flexiona a coluna ou o quadril direito. A dor a impede de andar. Podemos afirmar que se trata de:

- A) Lombalgia mecânica comum.
- B) Estenose de canal lombar com claudicação neurogênica.
- C) Radiculopatia L4, provavelmente por hérnia discal L4-L5.
- D) Radiculopatia S1, provavelmente por hérnia discal entre L5-S1.

Questão 14

CERMAN | AM | 2025

São glomerulopatias que podem cursar com Síndrome Nefrótica, EXCETO:

- A) Nefropatia por IgA
- B) Nefropatia Membranosa
- C) Nefropatia por Lesão Mínima
- D) Nefropatia por Anticorpo Anti-Membrana Basal Glomerular

Questão 15

CERMAN | AM | 2025

São manifestações que sugerem acometimento renal no Lúpus Eritematoso Sistêmico; assinale a adequada:

- A) Albuminúria <10mg e Hipertensão Arterial.
- B) Hematúria, hipertensão arterial, proteinúria.
- C) Anemia, creatinina sérica reduzida e edema.
- D) Anemia, rins reduzidos de tamanho e alopecia.

Questão 16

CERMAN | AM | 2025

Sobre reserva funcional e funcionalidade, assinale a alternativa CORRETA:

- A)** Paciente dependente tem maior reserva funcional.
- B)** A reserva funcional baixa indica menor risco de reações adversas a polifarmácia.
- C)** A reserva funcional destina-se à resposta fisiológica para recuperação da homeostase após alguma situação de estresse ao organismo.
- D)** Paciente 90 anos totalmente independente para atividades instrumentais e básicas de vida diária, apenas portador de HAS, tem menor reserva funcional que um paciente de 85 anos acamado, totalmente dependente, com múltiplas comorbidades.

Questão 17

CERMAN | AM | 2025

Quanto a vacinação para pacientes com DPOC, assinale a alternativa INCORRETA:

- A)** A vacina para Herpes Zoster está recomendada para pacientes acima dos 50 anos.
- B)** A vacinação para Influenza e COVID-19 está recomendada para todos os pacientes.
- C)** A vacina para Vírus Sincicial Respiratório (VSR) está recomendada para pacientes acima de 60 anos de idade.
- D)** Os pacientes que recebem a vacina conjugada 13 ou 15 Valente não precisam mais receber a vacina polissacarídica Pneumo 23.

Questão 18

CERMAN | AM | 2025

Em um paciente com tuberculose pulmonar e hepatotoxicidade ao esquema básico sem hepatopatia prévia, a reintrodução dos fármacos após a normalização da função hepática deve ser iniciada com a seguinte associação:

- A)** Rifampicina e etambutol.
- B)** Rifampicina e isonizida.
- C)** Rifampicina e pirazinamida.
- D)** Isoniazida e pirazinamida.

Questão 19

CERMAN | AM | 2025

Homem, 51 anos, retorna à consulta ambulatorial para resultado de exames após acidente vascular cerebral isquêmico há 1 mês, com boa evolução da fase aguda. Antecedente pessoal: cirurgia por úlcera gástrica hemorrágica há 2 anos. Hemoglobina = 13 g/dL, VCM = 73 fL, leucócitos = 9.000/ μ L (segmentados 76%, linfócitos 15%, monócitos 5%; eosinófilos 4%), plaquetas = 850.000/ μ L. Ferritina = 4 ng/mL. Exame físico: baço palpável a 2 cm do rebordo costal esquerdo. Qual o diagnóstico?

- A)** Traço talassêmico.
- B)** Anemia ferropriva.
- C)** Trombofilia hereditária.
- D)** Trombocitemia essencial.

Questão 20

CERMAN | AM | 2025

A respeito da Leucemia Mieloide Crônica (L.M.C.) em fase blástica, assinale a alternativa CORRETA:

- A)** Em pacientes em uso de Inibidor de Tirosino Quinase na fase blástica, o prognóstico é menos sombrio.
- B)** Pacientes que vinham usando inibidores de Tirosino-Quinase devem substituir o medicamento que utilizavam por outra droga da mesma classe terapêutica.
- C)** O Transplante Autólogo de Medula Óssea é a primeira linha de tratamento.
- D)** Hidroxiureia é um dos tratamentos de escolha.

Questão 21

CERMAN | AM | 2025

Você está de plantão em um hospital terciário e atende um paciente do sexo masculino, 23 anos, ciclista vítima de atropelamento em via pública. O paciente é trazido pelo SAMU imobilizado, em prancha longa, com acesso venoso periférico sendo administrado 500ml de Ringer Lactato. Estava consciente e relatava contusão abdominal pelo guidão da bicicleta devido ao trauma. O tórax era atípico, estável, com ausculta cardiopulmonar sem alterações. FC: 90bpm, FR: 16irpm, P.A.: 120x80mmHg, sem sangramentos externos. Glasgow 15 pontos, pupilas isocóricas e reativas a luz, sem déficits motores ou sensitivos periféricos. O abdome apresentava escoriações em abdome superior, era doloroso à palpação profunda, porém sem sinais de irritação peritoneal à admissão. Bacia estável, sem deformidades de membros ou lesões no dorso. Sobre o caso, assinale a alternativa CORRETA:

- A)** Neste momento, a melhor conduta para o caso é a realização de ultrassonografia de abdome para diagnóstico de lesões de vísceras maciças e ocas.
- B)** De acordo com o mecanismo de trauma apresentado, há indicação precisa de lavado peritoneal diagnóstico devido ao elevado risco de lesão pancreática.
- C)** Mesmo que a tomografia de abdome deste paciente evidencie trauma esplênico com extravasamento de contraste pela lesão, o tratamento não operatório pode ser factível.
- D)** Trauma abdominal contuso associada a dor abdominal ao exame físico, mesmo na ausência de irritação peritoneal, indica laparotomia exploradora pela elevada probabilidade de lesões de vísceras maciças.

Questão 22

CERMAN | AM | 2025

Trabalhador da construção civil, sexo masculino, 40 anos, vítima de queda de andaime de cerca de 3 metros, foi atendido no HPS 28 de Agosto em franco choque hipovolêmico devido a fratura de bacia e de fêmur esquerdo. Não havia lesões significativas em crânio, tórax e cavidade peritoneal. O paciente foi submetido a controle da hemorragia com transfusões de hemoderivados, empacotamento pélvico e fixação das fraturas, sendo encaminhado à UTI. À admissão observou-se hemoglobina 7g/dl, hematócrito 21%, 22.000 leucócitos com 80% de polimorfonucleares, gasometria com pH 7.3, HCO₃ mEq/l e Excesso de Base de -6, lactato 4,5mmol/L e potássio 5,8mEq/l. Sobre o caso, assinale a alternativa INCORRETA:

- A)** O uso do ácido tranexâmico está contraindicado para o caso acima devido ao resultante aumento da permeabilidade capilar e hiperestimulação da resposta inflamatória.
- B)** A extensa lesão tecidual associada a ativação desordenada de neutrófilos, produção de citocinas pró-inflamatórias, ativação do sistema de complemento e de células endoteliais podem resultar em predisposição a falência de múltiplos órgãos mesmo na ausência de infecção.
- C)** A leucocitose observada neste momento não é secundária a infecção, no entanto a resposta inflamatória sistêmica resulta em imunodepressão e maior predisposição a sepse.
- D)** A hiperpotassemia observada é secundária a lesão tecidual associada a transfusão de hemoderivados e pode ser agravada caso o paciente evolua com insuficiência renal aguda.

Questão 23

CERMAN | AM | 2025

Paciente do sexo feminino, 28 anos, obesa, dá entrada no serviço de pronto atendimento queixando dor abdominal contínua, intensa, em andar superior do abdome, irradiada para o dorso, há cerca de 8 horas, associada a vômitos. Nega febre, comorbidades, história de abuso de álcool e de episódios anteriores de dor. Ao exame físico, apresentava fascies de dor, lúcida e orientada, anictérica, FC: 90bpm, FR: 24irpm, P.A.: 100x80mmHg e oligúria. Seu abdome é globoso, bastante doloroso à palpação do andar superior, sem sinais de irritação peritoneal. Na avaliação laboratorial inicial, apresentava hemoglobina 12g/dl, hematócrito 42%, 11.000 leucócitos, lipase sérica de 1.800U/l, uréia: 20mg/dl e creatinina 1,0mg/dl. Sobre a conduta inicial para o caso, assinale a alternativa CORRETA:

- A)** O tratamento clínico inicial deve ser baseado em expansão volêmica vigorosa e antibioticoprofilaxia.
- B)** A hiperlipasemia denota provável evolução para quadro grave, indicando a avaliação tomográfica urgente.
- C)** Caso a ultrassonografia de abdome inicial não evidencie cálculos na vesícula, o próximo passo na definição da etiologia deste caso é a dosagem de triglicerídeos séricos.
- D)** A ausência de icterícia associada a leucocitose e ao padrão progressivo da dor indicam tratamento precoce com papilotomia endoscópica para prevenção da evolução para formas graves da doença.

Questão 24

CERMAN | AM | 2025

Paciente do sexo feminino, diabética, 72 anos de idade, é encaminhada de hospital do Interior do Estado para melhor suporte clínico e conduta especializada. A paciente iniciou quadro de dor tipo cólica em hipocôndrio direito, progressiva, irradiada para o dorso, associada a vômitos, iniciada após alimentação rica em gordura, há 6 dias sendo internada para tratamento clínico com analgesia e antibióticos. No entanto, evoluiu de forma insatisfatória, com queda do estado geral, persistência da dor e vômitos e início de febre, sendo solicitada sua transferência para Manaus. À admissão, a paciente se apresentava em regular estado geral, sonolenta, anictérica, taquicárdica, levemente taquipneica e hipotensa, com abdome algo distendido onde se palpa massa dolorosa em hipocôndrio direito. Leucograma: 18.000

com desvio à esquerda, uréia: 68mg/dl, creatinina 2.0mg/dl, TAP: 60%. A ultrassonografia evidenciou vesícula biliar distendida de paredes espessadas com infiltração de gás, com conteúdo espesso com debris, contendo cálculos e presença de nível hidroaéreo no seu interior. Sobre o caso acima, assinale a alternativa INCORRETA:

- A)** A colecistostomia percutânea transhepática guiada por USG é opção terapêutica adequada neste momento.
- B)** O caso pode ser classificado como Tokyo III, estando indicada a compensação clínica em UTI antes e após o controle do foco séptico.
- C)** Caso o tratamento não operatório seja efetivo no controle do foco séptico, a colecistectomia deve ser postergada após um período de 6 semanas.
- D)** Devido ao risco iminente de perfuração da vesícula, podemos afirmar que não haverá melhora das repercussões sistêmicas sem colecistectomia urgente para este caso.

Questão 25

CERMAN | AM | 2025

Paciente do sexo masculino, 70 anos, com história de dor abdominal tipo cólica difusa, acompanhada de vômitos e parada de eliminação de gases e fezes há 3 dias. Refere quadro de constipação crônica com uso frequente de medicações laxativas. Ao exame físico se encontra em REG, emagrecida, restrita ao leito, afebril, taquicárdica, taquipneica e normotensa. Seu abdome é algo distendido, sem cicatrizes ou circulação colateral, RHA ausentes, difusamente doloroso à palpação, porém dor mais intensa à palpação profunda da fossa ilíaca esquerda, sem sinais de irritação peritoneal. Toque retal com ausência de fezes ou sangue em dedo de luva. Foi submetida a tomografia de abdome que evidenciou a seguinte imagem:

Sobre o caso, assinale a alternativa CORRETA:



- A)** Se disponível, o tratamento endoscópico com colonoscopia flexível é uma alternativa terapêutica adequada para o caso.
- B)** Por se tratar de evidente isquemia mesentérica com possibilidade de perfuração, há indicação de laparotomia imediata para provável enterectomia.
- C)** Por se tratar de abdome agudo obstrutivo secundário a neoplasia de cólon esquerdo, a melhor conduta para o caso é a compensação clínica seguida de cirurgia de Hartmann.
- D)** Por se tratar de paciente idosa, com elevado risco cirúrgico e anestésico, o tratamento clínico com decompressão nasogástrica, reposição volêmica e uso de medicação pró-cinética é a escolha mais adequada neste momento.

Questão 26

CERMAN | AM | 2025

Você está no consultório e recebe um paciente do sexo masculino, 68 anos, sem comorbidades, acompanhado do seu filho. Eles trazem consigo uma colonoscopia que foi realizada como rotina para rastreamento de neoplasia de cólon. O exame não apresentava sinais de neoplasia ou pólipos, porém evidenciava divertículos no sigmóide, o que motivou a consulta para esclarecimento de dúvidas. A família está bastante ansiosa por ter lido na internet que a doença pode evoluir com perfuração e tem alta mortalidade. Você pacientemente os orienta a respeito da doença em questão. Qual das seguintes orientações é INCORRETA e não deve ser passada ao paciente?

- A)** “A presença dos divertículos no cólon não predispõe a câncer”.

- B)** “A diverticulose pode ser considerada como consequência do envelhecimento da parede do cólon e a chance da presença desta condição aumenta com a idade”.
- C)** “Mesmo que a crise de inflamação aguda ocorra, o quadro geralmente é leve e não complicado em mais de 80% dos casos, não necessitando de tratamento cirúrgico”.
- D)** “Se o paciente tiver a primeira crise aguda, mesmo que não complicada, ela tem grandes chances de ter novos quadros agudos, agora com complicação, sendo indicado a retirada cirúrgica do cólon sigmóide eletivamente antes que essas novas crises aconteçam”.

Questão 27

CERMAN | AM | 2025

Paciente do sexo feminino, 9 anos de idade, é trazida pela mãe ao pronto socorro devido a quadro de dor abdominal. Refere que a dor iniciou em região periumbilical há 1 dia e migrou para a fossa ilíaca direita (FID), evoluindo com piora da sua intensidade e presença de astenia e vômito. Nega diarréia, febre e sintomas urinários. Ao exame físico, a paciente se apresenta em bom estado geral, afebril, eupneica e hemodinamicamente estável. Seu abdome é plano, flácido, doloroso à palpação profunda em FID, com descompressão brusca dolorosa. Leucograma: 12.000 com desvio à esquerda. Proteína C reativa: 48mg/dl. Sobre o caso, assinale a alternativa INCORRETA:

- A)** Provavelmente esta paciente não terá indicação para drenagem da cavidade abdominal pós cirúrgica.
- B)** Apesar dos dados clínicos e laboratoriais sugerirem adequadamente o diagnóstico, este deve ser confirmado mediante tomografia de abdome.
- C)** Caso a paciente seja submetida a abordagem cirúrgica imediata, provavelmente a dose única de ceftriaxona e metronidazol administrada até 2 horas antes da cirurgia será suficiente no seu tratamento.
- D)** Caso a abordagem cirúrgica não possa ser realizada imediatamente, seja por disponibilidade profissional ou material do hospital local, o tratamento inicial com antibióticos e a postergação de cirurgia por 12 horas provavelmente não acarretará grande prejuízo a este paciente.

Questão 28

CERMAN | AM | 2025

Paciente do sexo masculino, 32 anos, obeso e fumante, refere história de pirose e sensação de regurgitação ácida há muitos anos, evoluindo com episódios de dor torácica ocasional, fazendo uso intermitente de anti-ácidos por conta própria. Refere, ainda, episódios de rouquidão. Nega disfagia e hematêmese. Traz consigo à consulta, uma endoscopia digestiva alta solicitada pelo médico do posto de saúde que evidenciou presença da transição esôfago gástrica 3cm acima da impressão diafragmática além de 2 erosões em mucosa esofagiana que ocupam cerca de 75% da sua circunferência. Sobre o caso, assinale a alternativa CORRETA:

- A)** A evolução crônica e os achados endoscópicos fecham o diagnóstico de esôfago de Barrett, indicando a hiatoplastia laparoscópica.
- B)** A evolução crônica com dor torácica e os achados endoscópicos sugerem evolução para carcinoma escamocelular de esôfago, estando indicada a esofagectomia.

- C)** Os achados endoscópicos sugerem que a funduplicatura laparoscópica será mais efetiva que o tratamento medicamentoso e comportamental para este paciente.
- D)** Os achados endoscópicos já são suficientes para fechar o diagnóstico e indicar o tratamento, excluído a necessidade de investigação com pHmetria e manometria esofagianas.

Questão 29

CERMAN | AM | 2025

Paciente do sexo masculino, 23 anos, queixando quadro de dor em região perianal há 3 dias que evoluiu com piora progressiva e início de picos de febre alta com calafrios. Ao exame físico, apresenta-se em REG, pálido e sudoreico, febril, taquicárdico, taquipneico e levemente hipotenso. O exame proctológico revelou área edemaciada e eritematosa, com flutuação e bastante dolorosa à palpação, em região perianal às 2:00. Devido ao quadro de dor, optou-se pela não realização do toque retal. Sobre o caso, assinale a alternativa CORRETA:

- A)** A indicação do tratamento cirúrgico dependerá de avaliação radiológica da musculatura pélvica, preferencialmente por ultrassonografia.
- B)** O quadro séptico justifica o uso de antibióticos como parte do tratamento deste paciente, todavia seu uso não influenciará na possível evolução com fístula perianal.
- C)** História de dor abdominal e diarreia crônica ou de doença inflamatória intestinal na família, sugere que o quadro acima pode ser secundário a retocolite ulcerativa incipiente.
- D)** Por tratar-se de complicação de doença hemorroidária, o tratamento de escolha neste momento é anti-inflamatórios orais, banhos de assento frios 3 vezes ao dia e uso tópico de pomadas à base de nifedipina.

Questão 30

CERMAN | AM | 2025

Paciente do sexo masculino, 68 anos, sobrepeso, fumante, é admitido com quadro de hematoquezia volumosa seguido de 1 episódio de enterorragia (sangue vermelho vivo) há 2 horas. No momento não está mais sangrando (SIC). Nega história de episódios prévios de sangramento, de cirurgias ou procedimentos endoscópicos recentes ou de doença inflamatória intestinal. É hipertenso e diabético e faz uso de aspirina e clopidogrel regularmente. Ao exame físico, apresenta-se pálido, FC: 94bpm, FR: 26irpm, P.A.: 100x70mmHg. Seu abdome é algo globoso, flácido e indolor à palpação. Toque retal com sangue em dedo de luva. Hemoglobina: 10.5g/dl. Sobre a conduta do caso acima, assinale a alternativa CORRETA:

- A)** A angiotomografia é excelente opção para determinação do local de sangramento no momento da admissão deste paciente, com resultados comparáveis aos da angiografia.
- B)** Já que o sangramento cessou e a hipotensão permissiva está relacionada a menor incidência de ressangramento, é seguro dar alta deste paciente para investigação ambulatorial.
- C)** Devido a instabilidade hemodinâmica que este paciente apresenta, a melhor forma de determinar o local do sangramento à sua admissão é a colonoscopia.
- D)** Já que a causa mais frequente desse tipo de sangramento em pacientes idosos é a neoplasia de cólon esquerdo, a laparotomia está indicada logo após a ressuscitação

volêmica adequada.

Questão 31

CERMAN | AM | 2025

Paciente do sexo masculino, 52 anos, com história de dispepsia crônica há vários anos que evoluiu com discreta piora há 3 meses associada a intolerância a alimentos sólidos, plenitude pós prandial e vômitos. Refere ter perdido cerca de 14kg no período e que após 1 episódio de hematêmese, procurou atendimento médico. Ao exame físico, o paciente se encontra hipocorado ++/4, eupneico, afebril, anictérico e hemodinamicamente estável. Abdome plano, flácido, simétrico e indolor à palpação, sem massas palpáveis ou ascite. Ausência de linfonodos palpáveis em região cervical e axilar. Traz consigo endoscopia que evidencia lesão úlcero-infiltrativa em região do antro gástrico, parcialmente obstruindo o piloro. O exame histopatológico revelou tratar-se de adenocarcinoma do tipo intestinal de Lauren. Sobre o estadiamento deste paciente, assinale a alternativa INCORRETA:

- A)** Por tratar-se de adenocarcinoma gástrico tipo Borrmann III, podemos afirmar que o estadiamento mínimo deste paciente é T3N2Mx.
- B)** A laparoscopia pode ser indicada no estadiamento deste paciente no intuito de realizar análise citológica peritoneal assim como coleta de ascite para estudo.
- C)** A ultrassonografia endoscópica é atualmente o melhor método de avaliação do grau de infiltração tumoral na parede do estômago (T) e acometimento linfonodal adjacente (N).
- D)** Apesar da tomografia computadorizada de abdome estar indicada para o estadiamento, sua acurácia para evidenciar linfonodos acometidos e pequenas metástases peritoneais não é adequada.

Questão 32

CERMAN | AM | 2025

Paciente do sexo feminino, 38 anos, vem ao consultório bastante preocupada por uma alteração evidenciada em ultrassonografia que fez em um pronto socorro por queixa de dor em baixo ventre. O exame em questão revelava imagem nodular hiperecótica e homogênea de 4cm em lobo direito do fígado. A paciente nega história de febre, dor no hipocôndrio direito, perda de peso e icterícia. Ao exame físico a paciente está em bom estado geral, bem nutrida, afebril, anictérica, eupneica, hemodinamicamente estável, sem edemas. Seu abdome é plano, flácido, indolor, sem ascite ou massas palpáveis. Você solicitou hemograma e dosagem de enzimas hepáticas. Bilirrubinas, TAP e albumina, além de tomografia computadorizada de abdome com contraste venoso. Tanto o hemograma quanto os demais exames bioquímicos eram normais. A tomografia evidenciou lesão bem definida, de limites precisos, com densidade semelhante à de vasos sanguíneos, captante de contraste, com preenchimento total de padrão centrípeto. Restante do parênquima hepático e demais órgãos abdominais sem alterações. Sobre o caso descrito, assinale a alternativa CORRETA:

- A)** Trata-se de hiperplasia nodular focal, estando indicada a hepatectomia devido ao altíssimo risco de malignização da lesão.
- B)** O diagnóstico de lesão metastática não pode ser adequadamente excluído, estando indicada a colonoscopia para investigação de provável tumor primário.
- C)** As características radiológicas são ambíguas e sugerem lesão neoplásica primária, estando indicada a biópsia percutânea por agulha para definição diagnóstica.

- D)** O padrão de imagem tomográfico é suficiente para fechar o diagnóstico de hemangioma e indicar tratamento expectante, porém a ressonância magnética apresenta maior sensibilidade e especificidade para o caso.

Questão 33

CERMAN | AM | 2025

Paciente do sexo masculino, 3 anos, 14kg, é trazido pela mãe ao pronto socorro referindo que a criança se queimou com água fervente ao puxar o cabo de uma panela que estava no fogão, há 30 minutos. Ao exame físico, a paciente apresenta choro forte e fascies de dor, com áreas queimadas com formação de bolhas, muitas delas já estouradas, acometendo hemiface e hemicrânio à esquerda, ombro e braço esquerdos, dorso do tórax e região lombar. Sobre o atendimento inicial deste paciente, assinale a alternativa INCORRETA:

- A)** Por se tratar de queimadura por escaldamento em criança com menos de 30kg e acima de 10% de superfície queimada, há indicação de internação hospitalar.
- B)** Uso precoce de colóides, principalmente nas primeiras 8 horas após a injúria, é contraindicado devido a maior incidência de derrame pleural, formação de ascite e aumento da pressão intra-abdominal.
- C)** Lavar a área queimada com água corrente ou soro em temperatura ambiente por cerca de 20 minutos, como medida inicial, potencializa uma evolução menos mórbida do caso.
- D)** O volume inicial a ser administrado para o paciente é aproximadamente de 1.100ml de Ringer Lactato nas primeiras 24 horas, contudo o débito urinário do paciente deve ser monitorado hora a hora e o volume infundido deve ser corrigido se houver necessidade.

Questão 34

CERMAN | AM | 2025

Paciente do sexo masculino, 62 anos, fumante, vem ao consultório queixando abaulamento inguino-escrotal à direita, as esforço físicos, mas que regride durante o repouso e decúbito. O paciente queixa que sente dores nesta região quando carrega peso e sobe escadas no trabalho, atrapalhando as atividades do seu dia a dia. Nega hipertensão e diabetes. Ao exame físico apresenta herniação inguino-escrotal de conteúdo abdominal, de moderado volume à manobra de Vasalva, redutível à palpação. Sobre o caso, assinale a alternativa CORRETA:

- A)** Os dados fornecidos nos permitem inferir que o paciente é portador de hérnia inguinal Nyhus IV.
- B)** O tempo de evolução e a idade do paciente são contraindicações para a técnica de Liechtestein para a correção da sua hérnia.
- C)** O tempo de evolução e o quadro de dor nos leva a inferir que o quadro é complicado com domiciliação e demanda tratamento cirúrgico urgente.
- D)** Queixas referentes a nictúria e diminuição do jato urinário, constipação e tosse crônica devem ser investigados e tratados no pré-operatório e o paciente deve ser orientado a, preferencialmente, cessar o tabagismo 2 meses antes do tratamento cirúrgico.

Questão 35

CERMAN | AM | 2025

Paciente do sexo masculino, 60 anos, agricultor, hipertenso e diabético, compareceu a Unidade Básica de Saúde para atendimento de rotina e acabou sendo triado para rastreamento da campanha Novembro Azul. Retorna a consulta com PSA 7ng/ml. Refere ter observado diminuição progressiva do jato urinário há 1 ano, noctúria e gotejamento terminal após a micção. Nega dor lombar, pélvica ou em coxas e perda de peso. O toque retal evidenciou área endurecida na próstata. Sobre os próximos passos da conduta deste caso, assinale a alternativa INCORRETA:

- A)** O caso é sugestivo de adenocarcinoma prostático e indica ultrassom trans-retal, tanto para a avaliação da próstata quanto como guia para biópsia.
- B)** A classificação histopatológica de Gleason fornece dados referentes à probabilidade de disseminação da doença e auxilia nas decisões terapêuticas que serão tomadas.
- C)** Devido à idade deste paciente e suas contraindicações clínicas para o tratamento cirúrgico, a opção terapêutica para o caso é a quimioterapia e terapia anti-estrogênica.
- D)** Uma vez confirmado o diagnóstico de neoplasia, o próximo passo é a avaliação do grau de invasão locorregional para a bexiga, uretra, vesículas seminais e trígono vesical, além de avaliar o comprometimento linfonodal pélvico, sendo a ressonância magnética um método bastante útil para este intento.

Questão 36

CERMAN | AM | 2025

Você é plantonista de uma sala de emergência e recebe o plantão com um paciente com diagnóstico de pneumonia e sepse. Para condução adequada do caso, você decide realizar uma punção venosa central para administração de medicamentos. Ciente que este procedimento requer conhecimento adequado da anatomia, relativa prática técnica e reconhecimento das suas complicações e seus respectivos manejos, assinale a alternativa INCORRETA:

- A)** Na técnica de Seldinger, o fio-guia deve ser retirado antes da inserção do catéter na veia previamente puncionada.
- B)** A punção da veia femoral apresenta maior risco de infecção do catéter e de trombose venosa profunda quando comparada com a punção da veia subclávia.
- C)** A punção venosa profunda guiada por ultrassonografia diminui consideravelmente os riscos de falha na punção, punção arterial e pneumotórax.
- D)** A punção da veia subclávia apresenta maior risco complicações mecânicas como o pneumotórax quando comparada com a punção da veia jugular interna.

Questão 37

CERMAN | AM | 2025

Paciente idoso, 75 anos, sequelado de AVC, institucionalizado, é trazido para atendimento médico por cuidadora devido a quadro de dispnéia progressiva e tosse há vários dias. Não sabe referir adequadamente sobre histórico de febre. Ao exame físico, o paciente se encontra emagrecido, algo dispneico (FR: 24irpm), afebril, FC: 68bpm, P.A. 110x70mmHg e edema de membros inferiores ++/4. A ausculta torácica, observamos estertoração em todo o hemitórax esquerdo, com murmúrio vesicular abolido em base e terço médio. Ausculta do hemitórax direito sem alterações. A ausculta cardíaca evidenciava ritmo em galope e bulhas hipofonéticas. Você solicitou uma radiografia de tórax que evidenciou derrame pleural de

volume moderado à esquerda, condensação para hilar no pulmão esquerdo e aumento da sombra cardíaca. Sobre a conduta frente a este derrame pleural, assinale a alternativa INCORRETA:

- A)** Níveis de proteína no líquido pleural abaixo de 2,9g/dl e relação do DHL no líquido pleural/DHL sérico menor que 0.5 suportariam a hipótese de insuficiência cardíaca congestiva.
- B)** A relação da proteína no líquido pleural/proteína sérica maior que 0,5 em efusão com pH abaixo de 7,2 e evidência de efusão pleural complexa à ultrassom corroboram a indicação de drenagem fechada de tórax para o caso.
- C)** Em caso de diagnóstico de exsudato secundário a processo pneumônico, os drenos de silicone mais calibrosos têm preferência de uso por apresentarem drenagem mais efetiva e menor entupimento que os drenos de baixo calibre.
- D)** A ultrassonografia pode confirmar a presença da efusão pleural, determinar características do líquido como a presença de debris ou espessamento pleural e guiar a toracocentese indicada para o caso com menor risco de pneumotórax iatrogênico.

Questão 38

CERMAN | AM | 2025

Paciente do sexo masculino, 55 anos, fumante, sobrepeso (IMC 28), é internado para uma hemicolectomia esquerda laparoscópica por neoplasia de cólon, com pretensão de cura. É hipertenso compensado. Nega diabetes, cardiopatia e demais comorbidades. Nega história de sangramentos ou de distúrbios de coagulação na família. Sua hemoglobina é 12g/dl e seu perfil de coagulação (contagem de plaquetas, TAP, TTPA e INR) são normais. A respeito do risco operatório de tromboembolismo venoso (TEV) para este paciente, assinale a alternativa INCORRETA:

- A)** O sexo masculino, a obesidade e a cirurgia abdominal laparoscópica por doença maligna, classificam este paciente como tendo altíssimo risco para TEV durante e após sua internação hospitalar.
- B)** Já que as provas de coagulação estão normais e o paciente não faz uso de drogas antiagregantes plaquetárias, há indicação para encerramento da profilaxia no momento da alta do paciente para o domicílio.
- C)** De acordo com seu risco de TEV, há indicação do uso de heparina de baixo peso molecular associada a medidas de profilaxia mecânica como meias compressivas e dispositivos de compressão pneumática intermitente.
- D)** Avaliação e controle de fatores como o controle do peso, interrupção do tabagismo, controle da pressão arterial, escolha de técnica cirúrgica adequada e estímulo à deambulação precoce, durante todo o período peri-operatório, diminuem o risco de TEV.

Questão 39

CERMAN | AM | 2025

Paciente do sexo feminino, 12 anos, é trazido pela mãe para consulta devido a pequena massa cística cervical, localizada na linha média a nível do osso hióide, móvel à deglutição. Ao exame físico observamos pequena lesão cística com sinais flogísticos e flutuação. Mãe refere história de outros processos inflamatórios locais que foram tratados com drenagem e antibióticos. Sobre a fisiopatologia e tratamento desta lesão, assinale a alternativa CORRETA:

- A)** Trata-se de herniação de saco laríngeo pela membrana tireo-hioidea e seu tratamento consiste em ressecção cirúrgica.
- B)** Trata-se de lesão congênita derivada de falha na migração do broto tireoidiano da base da língua e seu tratamento requer ressecção cirúrgica junto com fragmento do osso hióide.
- C)** Trata-se de lesão cística adquirida proveniente de déficit de drenagem de glândula salivar sublingual e seu tratamento consiste na marsupialização da lesão pela cavidade oral.
- D)** Trata-se de anomalia congênita derivada do fechamento inadequado do seio cervical a nível do 2º. arco branquial e seu tratamento se baseia em injeção de substância esclerosante na lesão.

Questão 40

CERMAN | AM | 2025

Você é chamado para avaliar uma paciente do sexo feminino, 2 anos de idade internada há 8 dias devido a quadro de pneumonia que necessitou drenagem de tórax. A pediatra solicita a sua avaliação sobre a possibilidade de retirada do dreno. A paciente deu entrada bastante chorosa, dispneica, com história de febre alta e tosse produtiva. Submetida à radiografia de tórax, foi observada condensação em base e terço médio do pulmão esquerdo e efusão pleural de moderado volume, sendo realizada a drenagem fechada de tórax com saída de 300ml de secreção sero-purulenta. Evoluiu com melhora do estado geral, do quadro febril e da leucocitose. Hoje, o paciente se encontra no 7º. dia pós drenagem, com dreno oscilante, com débito desprezível e fuga aérea quando a paciente respira fundo e chora. Todas as radiografias de controle mostravam pequeno pneumotórax “residual”, inclusive a que foi realizada hoje. Sobre o diagnóstico e conduta desta paciente, assinale a alternativa CORRETA:

- A)** Trata-se de empiema pleural resolvido, sendo indicada a retirada da drenagem de tórax.
- B)** Trata-se de encarceramento pulmonar pós empiema pleural, sendo indicada a toracotomia urgente.
- C)** Trata-se de formação de pneumatocele pós pneumonia, sendo indicada a retirada do dreno e ultrassonografia de tórax para diagnóstico.
- D)** A paciente evoluiu com fístula bronco-pleural, sendo indicada a manutenção do dreno e inicialmente tratamento com aspiração contínua.

Questão 41

CERMAN | AM | 2025

Nas pacientes com êmese na gestação, o tratamento medicamentoso inicial considerado de primeira linha é:

- A)** Fenotiazina e doxilamina
- B)** Piridoxina e doxilamina
- C)** Ondasetrona e piridoxina
- D)** Doxilamina e ondasetrona

Questão 42

CERMAN | AM | 2025

Primigesta, 42 anos, na 13ª semana de gestação, realizou exame morfológico que evidenciou aumento do índice de pulsatilidade médio das artérias uterinas e risco de pré eclampsia calculado 1/40. Assinale a alternativa CORRETA:

- A)** Iniciar ácido acetil salicílico em baixas doses (100-150mg) a noite até a 36ª semana.
- B)** Repetir exame na 20ª semana e se permanecer alterado iniciar ácido acetil salicílico em baixas doses (100-150mg) a noite até a 36ª semana.
- C)** Iniciar ácido acetil salicílico em baixas doses (100-150mg) a noite até a 20ª semana, repetir a avaliação e, se exame tiver normalizado, suspender aspirina.
- D)** Acompanhar no pré-natal de alto risco, e, se níveis pressóricos aumentarem, iniciar ácido acetil salicílico em baixas doses (100-150mg) a noite até a 36ª semanas.

Questão 43

CERMAN | AM | 2025

Paciente com amenorreia há 12 semanas, foi a maternidade referindo sangramento vaginal. Ao exame ginecológico observou-se sangramento vaginal e ao toque vaginal o útero estava intrapélvico. À ultrassonografia transvaginal o eco endometrial mediu 5,3 mm. Não foi evidenciado saco gestacional intrauterino. O Beta HCG anotado no cartão de pré-natal era 3500 mIU/ml. O resultado do Beta HCG solicitado na maternidade foi 2000 mIU/ml. Qual a principal hipótese diagnóstica:

- A)** Abortamento retido
- B)** Abortamento evitável
- C)** Abortamento completo
- D)** Abortamento incompleto

Questão 44

CERMAN | AM | 2025

São fatores de risco para gravidez ectópica:

- A)** Endometriose, mioma submucoso.
- B)** Tabagismo, uso de pílula de progesterona.
- C)** Multiparidade, anticoncepção de emergência.
- D)** DIU, Anticoncepcional combinada de baixa dose.

Questão 45

CERMAN | AM | 2025

A fecundação de um óvulo normal por dois espermatozoides da origem a:

- A)** Mola parcial
 - B)** Mola completa
 - C)** Gemelaridade dicoriônica
 - D)** Gemelaridade monocoriônica
-

Questão 46

CERMAN | AM | 2025

Paciente, 40 anos, GVI PIII (cesariana) AB II (com curetagem), assintomática, realizou ultrassonografia no primeiro trimestre que evidenciou saco gestacional localizado no segmento inferior e que evoluiu com a presença de placenta com lagos placentários com fluxos turbulentos ao Doppler, com adelgaçamento do miométrio e irregularidade na interface entre serosa uterina e bexiga no segundo trimestre. Tais achados são encontrados em qual das patologias:

- A) Placenta prévia parcial
- B) Espectro da placenta Acreta
- C) Doença trofoblástica gestacional
- D) Descolamento prematuro da placenta

Questão 47

CERMAN | AM | 2025

Nas gestações gemelares podemos afirmar que são dizigóticas se:

- A) Houver a presença de duas placentas
- B) Houver duas cavidades amnióticas
- C) Houver duas vesículas vitelínicas
- D) O sexo fetal for discordante

Questão 48

CERMAN | AM | 2025

Assinale a alternativa que corresponde a complicação mais frequente das gestações dicoriônicas:

- A) Sequência anemia-policitemia
- B) Síndrome da transfusão feto-fetal
- C) Restrição de crescimento fetal seletiva
- D) Sequência de perfusão arterial reversa

Questão 49

CERMAN | AM | 2025

Durante o período expulsivo do parto, qual é a técnica mais indicada para minimizar o risco de lacerações perineais e lesões neonatais?

- A) Realizar episiotomia de rotina para todos os partos vaginais.
- B) Realizar pressão no fundo uterino (manobra de Kristeller) para auxiliar na expulsão.
- C) Manter a flexão controlada da cabeça fetal durante a coroação, permitindo uma saída gradual.
- D) Solicitar que a parturiente faça força máxima (manobra de Valsalva) durante o período expulsivo.

Questão 50

CERMAN | AM | 2025

Gestante 28ª semana, foi a consulta de pré-natal levando resultado de teste de tolerância oral a glicose com 75 g de dextrosol. A glicemia de jejum foi 126 g/dl a de 1 hora foi 181 e a de 2 h 190 g/dl. Qual diagnóstico?

- A) Hiperglicemia
- B) Exame Normal
- C) Diabetes Mellitus
- D) Diabetes gestacional

Questão 51

CERMAN | AM | 2025

Qual é a abordagem mais recomendada para o manejo de um mioma uterino submucoso sintomático em uma mulher que deseja preservar a fertilidade?

- A) Prescrever agonistas do GnRH como tratamento de longo prazo.
- B) Realizar uma histerectomia abdominal para remoção definitiva do mioma.
- C) Indicar miomectomia histeroscópica para remoção do mioma submucoso.
- D) Recomendar embolização das artérias uterinas como primeira linha de tratamento.

Questão 52

CERMAN | AM | 2025

Uma paciente com diagnóstico recente de sífilis terciária apresenta sintomas neurológicos sugestivos de neurosífilis, incluindo cefaleia e alterações cognitivas. Qual é a terapêutica mais indicada para o tratamento de neurosífilis neste caso?

- A) Azitromicina 2g via oral, dose única.
- B) Ceftriaxona 1g via intramuscular uma vez ao dia por 10-14 dias.
- C) Penicilina G benzatina 2,4 milhões de unidades intramuscular semanalmente por três semanas.
- D) Penicilina G cristalina 18-24 milhões de unidades/dia por via intravenosa, divididas em doses a cada 4 horas por 10-14 dias.

Questão 53

CERMAN | AM | 2025

Uma paciente de 28 anos apresenta queixa de corrimento vaginal branco-acinzentado, com odor fétido semelhante a peixe, especialmente após as relações sexuais. Ao exame microscópico, nota-se a presença de células clue (células epiteliais cobertas por bactérias). Qual é o diagnóstico mais provável e o tratamento de escolha para essa condição?

- A) Vaginose bacteriana - metronidazol 500 mg, duas vezes ao dia por 7 dias.
- B) Vaginose bacteriana - Azitromicina 1g dose única por via oral.
- C) Tricomoníase - Azitromicina 1g, dose única por via oral.

D) Tricomoníase - metronidazol 2g, dose única por via oral.

Questão 54

CERMAN | AM | 2025

Assinale a alternativa CORRETA sobre as inibinas no ciclo fisiológico.

- A)** A inibina A é produzida pela granulosa dos folículos.
 - B)** A inibina A é principalmente secretada pelo corpo lúteo.
 - C)** A inibina B é principalmente secretada pela placenta.
 - D)** A inibina B é inibida pelo aumento do FSH.
-

Questão 55

CERMAN | AM | 2025

Qual sintoma mais comum da transição menopausal e pós menopausa inicial?

- A)** Dispareunia
 - B)** Osteoporose
 - C)** Distúrbios do sono
 - D)** Sintomas vasomotores
-

Questão 56

CERMAN | AM | 2025

Paciente 20 anos, foi ao ginecologista levando resultado de exame que evidenciou imagem cística com ecos em vidro fosco no ovário direito de 550 cm³. Foi submetida a cirurgia videolaparoscópica para a retirada do cisto e foi identificado que o conteúdo tinha aspecto de chocolate. Essa característica está mais comumente associada a:

- A)** Fibroma
 - B)** Teratoma
 - C)** Endometrioma
 - D)** Cistoadenoma seroso
-

Questão 57

CERMAN | AM | 2025

Mulher 30 anos, diabética com vasculopatia, deseja iniciar anticoncepção. Não quer em nenhuma hipótese usar DIU. De acordo com os critérios de elegibilidade da OMS (2015), a conduta adequada é prescrever:

- A)** anel vaginal
 - B)** Injetável mensal
 - C)** adesivo semanal
 - D)** Implante de etonogestrel
-

Questão 58

CERMAN | AM | 2025

Mulher de 60 anos, menopausada há 5 anos, vem à consulta com quadro de sangramento vaginal infrequente, em pequena quantidade, acíclico. Nega outras queixas. Exame físico sem alterações. Ultrassom transvaginal evidenciou endométrio linear medindo 1.4 mm. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

- A) Pólipo endometrial.
- B) Atrofia endometrial.
- C) Mioma submucoso.
- D) Hiperplasia endometrial.

Questão 59

CERMAN | AM | 2025

Paciente 30 anos, assintomática, realizou exame de ultrassonografia mamária de rotina que evidenciou nódulo sólido, hipoecóico, classificação BI-RADS 4A. Assinale a alternativa que representa a conduta adequada para o melhor cuidado com a paciente?

- A) Core biopsy
- B) Controle em 6 meses
- C) Controle em 1 ano
- D) Punção por agulha fina

Questão 60

CERMAN | AM | 2025

Durante uma histerectomia abdominal, o cirurgião deve identificar e ligar a artéria uterina para evitar sangramento excessivo. Ao fazer isso, ele precisa tomar cuidado para evitar lesionar qual estrutura anatômica adjacente que passa imediatamente inferior à artéria uterina?

- A) Ureter
- B) Nervo pudendo
- C) Veia ílíaca interna
- D) Ligamento uterossacro

Questão 61

CERMAN | AM | 2025

Pré-escolar de três anos, sexo feminino, estrófica, é levada ao Ambulatório Araújo Lima por sua mãe, com queixa que o referido não come nada, só aceita salgadinhos e guloseimas. Para comer é “chantageada” e na ocasião apresenta vômito logo em seguida da ingestão do alimento. É ofertado frutas, verduras e legumes as quais aceita mas não engole, cospe tudo (sic). O alimento que melhor aceita é leite com chocolate, que é oferecido várias vezes ao dia devido a aceitação. Os sintomas estão relacionados a qual quadro clínico:

- A) Inapetência.
- B) Neofobia alimentar.
- C) Sensibilidade láctea.
- D) Transtorno alimentar.

Questão 62

CERMAN | AM | 2025

O teste da orelhinha ou exame de emissão otoacústica deve ser realizado em:

- A) Em recém-nascidos com alterações crânio facial.
- B) Em todos recém-nascido entre o 3º e 5º dia de vida.
- C) Em recém-nascido que tenha recebido ventilação respiratória por mais de 5 dias.
- D) Em recém-nascidos que apresentam alterações clínicas sugestivas de infecção congênita.

Questão 63

CERMAN | AM | 2025

Qual o conjunto de dados clínicos necessários para que seja estabelecido o diagnóstico de ANAFILAXIA:

- A) Dor abdominal e vomito após exposição a um alérgeno conhecido.
- B) Sincope que tem início minutos ou horas após exposição a um alérgeno provável.
- C) Sintomas gastrointestinais persistente após exposição a um alérgeno conhecido.
- D) Hipotensão que tem início minutos ou horas, após exposição a um alérgeno conhecido.

Questão 64

CERMAN | AM | 2025

Recém-nascido a termo, Apgar 9 e 10, peso ao nascer 3.600 kg, em aleitamento materno exclusivo, apresentou icterícia, necessitando de fototerapia no 3º dia de vida, na oportunidade está com 3.100 kg. Os exames laboratoriais afastaram a hipótese de infecção, incompatibilidade sanguínea e deficiência de G6PD. Qual a conduta a ser tomada:

- A) Introduzir fórmula láctea.
- B) Iniciar hidratação venosa.
- C) Manter aleitamento materno.
- D) Oferecer solução glicosada a 5% por via oral.

Questão 65

CERMAN | AM | 2025

Adolescente de 15 anos, sexo feminino, procurou o serviço ambulatorial acompanhada de seus pais que estão preocupados com sua magreza. Na anamnese relatam que a filha apresenta medo extremo da obesidade, analisa todas as calorias dos alimentos que vai ingerir

e está sempre procurando sites de alimentação na internet com objetivo de manter o peso abaixo de 40kg. Ao exame físico: emagrecida, hipocorada, peso 39 kg, escore Z-3, altura 1,58 cm, IMC=15,5, TAX: 36° C, PA: 100X65 mmHg, FC: 48 bpm, Estadiamento de TANNER M4P4. Qual a hipótese diagnóstica mais provável:

- A) Ortorexia.
- B) Neofobia.
- C) Anorexia nervosa.
- D) Adolescência normal.

Questão 66

CERMAN | AM | 2025

Escolar de 9 anos, apresenta quadro de febre alta (TAX: 40°C), tonsilite pultácea, petéquias em palato, exantema micropapular difuso com intensidade nas dobras de flexão (SINAL DE PASTIA) e palidez peribucal com início há cinco dias (SINAL DE FILATOV). A principal hipótese diagnóstica e a conduta indicada para o caso é:

- A) Doença de Kawasaki - administrar imunoglobulina por via endovenosa.
- B) Escarlatina - administração de penicilina por via parenteral.
- C) Mononucleose infecciosa - administrar sintomático.
- D) Mononucleose infecciosa - administrar prednisona oral.

Questão 67

CERMAN | AM | 2025

Recém-nascido com quatro dias de vida, em aleitamento materno exclusivo, mãe relata dificuldade para mamar, hipotonia, alguns episódios de vômito e hiperirritabilidade. Na admissão no serviço de emergência, RN apresenta quadro de acidose metabólica, evoluindo para coma sendo encaminhado ao CTI. A mãe por sugestão de uma amiga segue dieta vegetariana. O quadro apresentado é secundário a carência de:

- A) Biotina.
- B) L. carnitina.
- C) Hidroxifolato.
- D) Cobalamina.

Questão 68

CERMAN | AM | 2025

Recém-nascido à termo nasceu apresentando malformação congênita de parede abdominal, ocasionando exposição de estrutura intra abdominal. A hipótese diagnóstica é:

- A) Gastroquise.
 - B) Toco-traumatismo.
 - C) Síndrome de Prune-Belly.
 - D) Síndrome Beckwith-Wiedemann.
-

Questão 69

CERMAN | AM | 2025

Pré-escolar de 4 anos, sexo masculino, pesando 16 kg, terá que submeter-se a um procedimento cirúrgico para correção de uma malformação congênita. Exames laboratoriais pré-operatório: hematócrito 29%, hemoglobina 9,4g/dL, VCM 65 fL. O pediatra fez o diagnóstico de anemia ferropriva e instituiu o tratamento com sulfato ferroso (250mg/10 ml) oferecer 2,5 ml uma vez ao dia, antes do almoço. No 21º dia de tratamento foi solicitado novo hemograma e obteve-se praticamente os mesmos índices do hemograma anterior. Qual a melhor conduta a ser adotada neste caso:

- A)** Iniciar investigação para outras causas de anemia.
- B)** Corrigir a dose de ferro necessária para o tratamento.
- C)** Manter a mesma dose de sulfato ferroso e aguardar mais uma semana.
- D)** Indicar a correção cirúrgica da anomalia independente do resultado do hemograma.

Questão 70

CERMAN | AM | 2025

Recém-nascido com 18 dias de vida, em aleitamento materno exclusivo, evolui há 2 semanas com quadro de vômito, perda de peso, icterícia e colúria. Ao exame físico: peso - 2.700kg, comprimento - 50cm, icterícia 3+/4+, fígado palpável a 3 cm do RCD. A pesquisa urinária de substâncias redutoras foi positiva. O diagnóstico em questão é GALACTOSEMIA, qual o tratamento a ser proposto:

- A)** Dieta isenta de lactose.
- B)** Dieta cetogênica.
- C)** Piloromiotomia.
- D)** Ganciclovir.

Questão 71

CERMAN | AM | 2025

Mãe leva sua filha de 2 anos e 10 meses de idade na Unidade Básica de Saúde para consulta de puericultura, pois o Agente Comunitário de Saúde constatou atraso vacinal. Família vive em uma comunidade ribeirinha e não estavam conseguindo vir à cidade por conta da seca severa. As últimas vacinas que ela havia recebido rinha sido com um ano de idade. O médico disse que a criança estava bem e não tinha contra-indicação para ser vacinada, sendo orientada a procurar o setor de imunizações com a finalidade de atualização. Qual a melhor conduta para atualizar a caderneta de vacinas da criança, segundo o PNI-MS?

- A)** Aplicar agora a Tetraviral (S,R,C,V), hepatite A, VOP e DPT.
- B)** Aplicar agora a Hepatite B, VOP, Tetraviral (S,R,C,V).
- C)** Aplicar agora a VOP e DPT, esperar 15-30 dias para administrar Tetraviral (S,R,C,V).
- D)** Aplicar agora a hepatite A, PNM10V e Meningo C.

Questão 72

CERMAN | AM | 2025

Pedro nasceu com 35 semanas de gestação, peso ao nascer 1.950g, comprimento 46cm e perímetro cefálico 33 cm. De acordo com as curvas de crescimento intrauterino (Intergrowth-21st), o peso de nascimento estava abaixo do P10. Quais os diagnósticos desta criança?

- A) Prematuridade, baixo peso ao nascer, retardo de crescimento.
- B) Prematuridade, baixo peso ao nascer, pequeno para Idade Gestacional.
- C) Prematuridade, muito baixo peso ao nascer, retardo de crescimento.
- D) Prematuridade, muito baixo peso ao nascer, pequeno para Idade Gestacional.

Questão 73

CERMAN | AM | 2025

Alessandro é um escolar de 8 anos em seu consultório. O menino sofre bullying na escola por causa da sua altura. A mãe está preocupada, pois o acha muito baixo, perto dos amigos. No manejo inicial para avaliar essa criança, além de confirmar se há realmente baixa estatura, a conduta mais apropriada é:

- A) Solicitar cariótipo, hormônio de crescimento e encaminhar ao endocrinologista.
- B) Solicitar ultrassonografia de abdome total, Rx de joelho Ap e perfil, dosar insulina e cortisol.
- C) Solicitar dosagem de gonadotrofinas, hormônio de crescimento e fazer estadiamento de Tanner.
- D) Colocar no gráfico para ver se há baixa estatura, demarcar o alvo parental, calcular velocidade de crescimento e solicitar Rx de mão e punho esquerdo.

Questão 74

CERMAN | AM | 2025

Eduardo tem três anos e há 10 dias apresenta febre alta. Ao exame físico, apresenta edema palpebral bilateral, petéquias no palato, exsudato amigdaliano, adenomegalia cervical anterior e posterior, fígado palpável a 4cm do rebordo costal direito e baço a 5cm do rebordo costa esquerdo. Qual exame mais indicado para confirmação do diagnóstico neste momento?

- A) Sorologia para dengue.
- B) Sorologia para Epstein-Barr vírus.
- C) Aspirado e cultura de medula óssea.
- D) Teste rápido para pesquisa de estreptococo do grupo A.

Questão 75

CERMAN | AM | 2025

João, 10 anos, mora em Careiro Castanho e está há 12 dias com febre. Refere também, cefaleia, mialgia e dores abdominais. Previamente hígido sem histórico de doenças agudas ou crônicas. Fez exame de gota espessa que revelou diagnóstico de Plasmodium vivax 2+. Qual a melhor conduta neste caso, considerando que a criança apresenta G6PD normal:

- A) Cloroquina por 3 dias e Primaquina por 7 dias.
- B) Cloroquina por 3 dias e Tafenoquina dose única.
- C) Artemeter + lumefantrina por 3 dias e Primaquina dose única.
- D) Artemeter + lumefantrina por 3 dias e Primaquina por 14 dias.

Questão 76

CERMAN | AM | 2025

Paciente comparece na consulta de seguimento de seu filho de 2 meses de idade, que está em aleitamento exclusivo. Refere dor e ardor no mamilo esquerdo, prurido e “fisgadas” que se irradiam para o interior da mama durante a amamentação. Nega episódios de mamilos pálidos ou arroxeados. O exame das mamas revela hiperemia dos mamilos e aréolas, que se mostram brilhantes, com aspecto friável. Exame físico do lactente sem alterações. Dentre as seguintes propostas terapêuticas, a melhor para este caso é:

- A) Nistatina tópica para mãe.
- B) Neomicina tópica para mãe.
- C) Nistatina tópica para mãe e lactente.
- D) Gelo local e antiinflamatório para mãe.

Questão 77

CERMAN | AM | 2025

Sobre o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, pode-se afirmar que:

- A) O final da puberdade nos meninos é o odor axilar.
- B) A telarca é o primeiro sinal de puberdade nas meninas.
- C) O primeiro sinal de puberdade masculina é o nascimento dos pelos pubianos.
- D) Nas meninas, a menarca ocorre simultaneamente à telarca, marcando o início da puberdade.

Questão 78

CERMAN | AM | 2025

Mãe com 26 anos, G2P2, não realizou pré-natal e não usou nenhuma medicação na gravidez. No dia do parto apresenta teste treponêmico reagente e teste não treponêmico reagente 1:512. Recém-nascido nasceu de parto vaginal, sexo feminino, 40 semanas e 3 dias, com peso de nascimento de 2.475 gramas e hepatoesplenomegalia ao exame físico. Sorologias da criança: teste treponêmico reagente e teste não treponêmico reagente 1:128. Liquor: leucócitos = $287/\text{mm}^3$ (10% neutrófilo, 25% linfócitos), proteína = 350 mg/dl, glicose = 12 mg/dl; glicemia 75 mg/dl. O tratamento para o recém-nascido é:

- A) Benzilpenicilina procaína 50.000 UI/kg, endovenosa, dose única.
- B) Benzilpenicilina cristalina 50.000 UI/kg, endovenosa, dose única.
- C) Benzilpenicilina cristalina 50.000 UI/kg/dose, endovenosa, por 10 dias.
- D) Benzilpenicilina procaína 50.000 UI/kg/dose, intramuscular, uma vez ao dia, por 10 dias.

Questão 79

CERMAN | AM | 2025

A hipoglicemia neonatal é caracterizada pelos seguintes sinais e sintomas:

- A)** tremores e convulsões.
- B)** tremores e hipertonia.
- C)** taquipneia e hipertonia.
- D)** choro forte e sucção débil.

Questão 80

CERMAN | AM | 2025

Um recém-nascido de 38 semanas apresenta microcefalia, tomografia de crânio com calcificações difusas, fundo de olho com coriorretinite bilateral e avaliação auditiva sem comprometimento. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa CORRETA.

- A)** A decisão do tratamento depende da carga viral.
- B)** As lesões ósseas encontradas geralmente são bilaterais e simétricas, incidindo mais no rádio e na ulna.
- C)** Caso a mãe tivesse com a vacinação em dia, esse desfecho poderia ser evitado.
- D)** O tratamento medicamentoso deve ser feito por um ano.

Questão 81

CERMAN | AM | 2025

Carlos é um adolescente de 12 anos trazido por sua mãe à UBS para atualização de seu cartão vacinal. A mãe relata que ficou 3 anos sem procurar a unidade de saúde pois ficou confusa com tantas informações negativas acerca das vacinas durante a pandemia de COVID-19. Em relação à atualização da vacinação de Carlos:

- A)** Se o adolescente não recebeu nenhuma dose da vacina contra o HPV deve receber uma dose única.
- B)** Se o adolescente recebeu duas doses da tríplice viral, deve receber mais uma dose de reforço agora.
- C)** Caso o adolescente tenha recebido três doses da vacina contra hepatite B, nesse momento, deve receber um reforço.
- D)** Caso o adolescente ainda não tenha recebido nenhuma dose da vacina de febre amarela até os 5 anos de idade, deve receber duas doses com intervalo de um mês entre elas.

Questão 82

CERMAN | AM | 2025

Luana, 24 anos, primigesta, iniciou o pré-natal na UBS Castanheiras. Após realização de sua última ultrassonografia obstétrica, recebeu o diagnóstico de malformação fetal. Desse modo, Luana foi encaminhada para consultas na unidade de pré-natal de alto risco, sendo orientada pela equipe de saúde que também deveria manter o acompanhamento com a equipe de

saúde da UBS Castanheiras. Assinale a alternativa que corresponde ao atributo da Atenção Primária à Saúde aplicado ao caso acima:

- A) Integralidade
- B) Longitudinalidade
- C) Competência cultural
- D) Coordenação do cuidado

Questão 83

CERMAN | AM | 2025

Joaquim, 6 meses, é trazido por sua mãe Jéssica em consulta de puericultura com a médica da equipe de estratégia de saúde da família do bairro. Após 6 meses de amamentação exclusiva de sucesso, Jéssica tem dúvidas se já deve iniciar a introdução alimentar do filho. Qual das alternativas abaixo contém um dos sinais de prontidão que deve ser pesquisado pela médica para que seja iniciada a introdução alimentar de Joaquim?

- A) Firma a cabeça.
- B) Senta com apoio.
- C) Evita levar as mãos a boca.
- D) Reflexo de protrusão da língua forte.

Questão 84

CERMAN | AM | 2025

Dr. Marcos atende em uma comunidade isolada do interior do Amazonas. Um de seus comunitários, Sr. Miqueias, 35 anos, etilista crônico, iniciou quadro de tosse, febre noturna, sudorese e perda de aproximadamente 15kg nos últimos 2 meses. Foi solicitada baciloscopia para tuberculose que resultara positivo. Considerando os contatos próximos de Sr. Miquéias, a informação de que em todo o país há indisponibilidade por tempo indeterminado da prova tuberculínica e que não está disponível o exame Interferon Gamma Release Assay (IGRA), assinale a seguir qual dos contatos do paciente-índice deverá receber tratamento prioritário para infecção latente da tuberculose:

- A) Maria, 65 anos, mãe, diabética e hipertensa, com tosse há 15 dias, radiografia de tórax suspeita.
- B) Sandreia, 15 anos, filha, sem comorbidades, assintomática, radiografia de tórax sem alterações.
- C) Malaquias, 24 anos, pessoa vivendo com HIV/aids (PVHA), assintomático, radiografia de tórax sem alterações.
- D) Sandra, 24 anos, esposa de Miquéias, gestante de 32 semanas, assintomática, não realizou radiografia de tórax.

Questão 85

CERMAN | AM | 2025

Você estava lendo um estudo sobre uma nova estatina que prometia redução do risco de

infarto agudo do miocárdio (IAM). Você identifica no estudo que houve 15 casos de IAM em 1000 pessoas que usaram a estatina, enquanto que no grupo onde a estatina não foi usada a quantidade de IAM foi de 20 em 1000 pessoas. Considerando as informações acima, podemos concluir que o Número Necessário para Tratar (NNT) deste estudo foi de:

- A) 5
- B) 25
- C) 75
- D) 200

Questão 86

CERMAN | AM | 2025

A comunicação de notícias difíceis, como a de um diagnóstico ou óbito, é um elemento da relação médico-pessoa essencial na construção de planos terapêuticos e de seguimento. Qual das alternativas a seguir descreve uma técnica CORRETA a ser executada na comunicação de uma notícia difícil?

- A) O médico deverá utilizar linguagem de alto conteúdo emocional (como gritos ou expressão facial de preocupação) na hora de comunicar uma notícia difícil.
- B) Após comunicar uma notícia difícil, o médico deve utilizar frases empáticas ou utilizar o silêncio funcional para permitir que o paciente acomode as emoções.
- C) A comunicação de uma má notícia deve ser realizada com termos técnicos do jargão médico.
- D) A informação de óbito a familiares deverá ser feita utilizando-se de metáforas (Ex: “o paciente já não está mais entre nós”).

Questão 87

CERMAN | AM | 2025

Você é médico de uma Unidade Básica de Saúde e, preocupado com o crescente número de pacientes com dependência ao álcool, você decide avaliar se o etilismo é mais comum entre os hipertensos e diabéticos comparados com aqueles que não são. Você revisou, retrospectivamente, todos os prontuários de pacientes hipertensos e diabéticos nos últimos cinco anos, comparando-os com a mesma quantidade de pacientes sem hipertensão ou diabetes no mesmo período. Qual das alternativas a seguir descreve CORRETAMENTE o tipo de estudo que você realizou?

- A) Coorte.
- B) Ecológico.
- C) Caso-controle.
- D) Ensaio clínico randomizado.

Questão 88

CERMAN | AM | 2025

Pedro tem 30 anos e teve diagnóstico de sífilis por teste rápido durante o período de pré-natal

da esposa. Realizou três doses de penicilina benzatina, e apresentava um VDRL inicial de 1:128. Seis meses após o tratamento seu VDRL estava em 1:16, mantendo a titulação no VDRL do 9o. mês. Todavia, ao realizar o VDRL no 12o. mês pós-tratamento, o valor encontrado foi de 1:64. Diante da situação apresentada, qual a conduta CORRETA?

- A) Repetir VDRL daqui a três meses.
- B) Indicar novo tratamento com penicilina benzatina.
- C) Considerar o valor de VDRL do 12o. mês como cicatriz sorológica.
- D) Repetir teste rápido de sífilis e tratar somente se resultado positivo.

Questão 89

CERMAN | AM | 2025

O instrumento de abordagem familiar que representa graficamente todos os sistemas envolvidos e relacionados com a família e o meio onde vivem, facilitando a visualização de áreas que podem ser exploradas para melhorar o sistema social de apoio por toda a equipe de saúde se chama:

- A) Ecomapa.
- B) Genograma.
- C) Apgar familiar.
- D) Escala de Coelho-Savassi.

Questão 90

CERMAN | AM | 2025

O sinal de Murphy é um dos sinais clínicos avaliados na investigação de colecistite aguda. A literatura mostra que o sinal de Murphy possui uma sensibilidade de 60% e uma especificidade de 85%. Considerando as informações acima, qual o valor da razão de verossimilhança (likelihood ratio) positiva do sinal?

- A) 0,47
- B) 0,7
- C) 4
- D) 25

Questão 91

CERMAN | AM | 2025

Maria Valentina, 29 anos, comparece à unidade para sua 1º consulta de pré-natal, atualmente está com 11 semanas e 3 dias. Durante a coleta da história, Maria Valentina informa que essa é sua 5º gestação, e que na sua última gestação há 1 ano e 9 meses atrás, foi bem tranquila, mas na hora do parto seu bebê nasceu muito grande, não sabe dizer ao certo com quantos quilos, mas sabe que foi mais de 4kg. Investigando a sua história familiar, afirma que sua mãe é diabética e hipertensa. Ao exame físico, observa-se:

P: 103kg Alt: 1,62m IMC:39,2 kg/m² PA: 136x93mmHg

Nesta primeira consulta, Maria Valentina apresentou alguns fatores que nos fazem ficar

atentos ao desenvolvimento de diabetes gestacional. Identifique a alternativa que apresenta tais fatores de risco:

- A)** História familiar, multípara, Obesidade.
- B)** Obesidade, multípara, valor anormal da pressão.
- C)** Idade superior a 25 anos, macrossomia, história familiar.
- D)** Valor anormal da pressão, macrossomia, idade superior a 25 anos.

Questão 92

CERMAN | AM | 2025

O SOAP é um acrônimo que corresponde: S - Subjetivo, O - Objetivo, A - Avaliação e o P - Plano, e é uma ferramenta que se caracteriza por ser uma forma de registro da história clínica que permite visualizar o cuidado longitudinal. Dito isto, assinale a alternativa CORRETA sobre esta ferramenta:

- A)** No objetivo anota-se tudo que o paciente nos fala.
- B)** O subjetivo aborda a história do paciente e o motivo da consulta.
- C)** Na avaliação coloca-se as hipóteses diagnósticas pensadas durante a consulta.
- D)** No plano registra-se as observações profissionais sobre o paciente, como expressões faciais, aparência, como lida com afeto, entre outras percepções.

Questão 93

CERMAN | AM | 2025

Clarissa, 18 anos, acabou de receber alta da maternidade com Felipe, 2 dias, seu primeiro filho. Durante a gravidez, Clarissa fez 9 consultas de pré-natal com a equipe de saúde do seu bairro e durante as consultas a enfermeira reforçou para que ela avisasse quando o bebê nascesse e tivesse alta. Então a caminho de casa, Clarissa manda mensagem para Andressa, enfermeira que a acompanhava:

- Bom dia, enfermeira, tudo bem? Estou saindo da maternidade com o Felipe e gostaria de saber como será feito o acompanhamento dele por aí pela UBS. Assinale a alternativa que corresponde às consultas mínimas que devem ser realizadas nos 2 primeiros anos de vida do Felipe.

- A)** As consultas devem ocorrer mensalmente até o 6 mês de vida, seguida de consultas semestrais até o segundo ano de vida.
- B)** A primeira avaliação deve ser realizada em até 7 dias após a alta da maternidade, seguida de consultas no 1°, 2°, 4°, 6°, 9°, 12°, 18° e 24° meses.
- C)** As consultas devem ser realizadas mensalmente até o primeiro ano de vida, e no segundo ano de vida as consultas devem ocorrer semestralmente.
- D)** A primeira avaliação deve ser realizada em até 7 dias após a alta da maternidade, seguido de consultas mensais no primeiro ano de vida e semestrais durante o segundo ano.

Questão 94

CERMAN | AM | 2025

As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica seguem normativas específicas do Ministério da Saúde, porém existem atribuições comuns a todos os membros das equipes. De acordo com as atribuições comuns a todos os componentes da equipe, assinale a alternativa CORRETA:

- A)** Realizar procedimentos como administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, lavagem, preparação, esterilização de materiais, entre outras atividades.
- B)** Realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco, de acordo com protocolos estabelecidos.
- C)** Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território.
- D)** Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe.

Questão 95

CERMAN | AM | 2025

O programa HIPERDIA é uma iniciativa do Sistema Único de Saúde (SUS) que visa o controle e a prevenção de doenças crônicas, especialmente diabetes e hipertensão. Qual das alternativas a seguir descreve CORRETAMENTE um dos principais objetivos do programa HIPERDIA na Atenção Primária à Saúde?

- A)** Realizar campanhas de vacinação para a população.
- B)** Focar no tratamento farmacológico das doenças crônicas.
- C)** Promover a internação hospitalar de pacientes com doenças crônicas.
- D)** Oferecer acompanhamento e monitoramento contínuo de pacientes com hipertensão e diabetes.

Questão 96

CERMAN | AM | 2025

Cláudio, 62 anos, comparece à unidade para acompanhamento semestral e renovação da receita de Losartana 50mg 2x dia. Ao passar pela triagem, apresenta as seguintes medidas antropométricas: P:79kg Alt: 168cm IMC: 28Kg/m² PA: 146x97mmHg Dextro: 146 mg/dl em jejum. Mariana, médica que o acompanha a cerca de 4 anos, se preocupa com a glicemia, visto que durante esses anos nunca apresentou alteração nos exames, apesar de ter histórico familiar de diabetes. Qual alternativa corresponde ao plano mais adequado para Mariana seguir?

- A)** Conversar sobre diabetes e explicar a doença para Cláudio, realizar orientações sobre mudança de estilo de vida, solicitar novo exame de glicemia em jejum e hemoglobina glicada ou teste oral de tolerância à glicose, e retornar assim que os resultados ficarem prontos.
- B)** Realizar orientações sobre mudança de estilo de vida, solicitar exames glicemia em jejum, hemoglobina glicada ou teste oral de tolerância à glicose e iniciar metformina 500mg 1x dia, até o retorno em 3 meses, quando irá realizar exames de controle glicêmico.
- C)** Conversar sobre diabetes e explicar a doença para Cláudio, realizar orientações sobre mudança de estilo de vida, e agendar retorno em 6 meses para reavaliar com exames.

- D)** Conversar sobre diabetes e explicar a doença para Cláudio, iniciar metformina 500mg 1x dia, até o retorno em 3 meses, quando irá realizar exames de controle glicêmico.
-

Questão 97

CERMAN | AM | 2025

Uma cidade de médio porte no interior do Amazonas possui um quantitativo crescente de idosos com um aumento nos casos de diabetes entre seus habitantes. A maioria das UBS para acompanhamento e tratamento de diabetes está localizada no centro desta cidade, oferecendo consultas e exames em horários limitados... Já nos bairros da periferia, onde vivem muitos idosos de baixa renda, o acesso ao tratamento é limitado... O cenário gera uma desigualdade de acesso ao tratamento... Diante desse cenário, qual princípio do SUS o gestor de saúde deve considerar para garantir que idosos com diabetes, independentemente de onde vivem, tenham acesso igualitário a acompanhamento e tratamento?

- A)** Integralidade, para garantir que todos os serviços de saúde, como consultas e exames, estejam disponíveis para toda a população da cidade igualmente.
- B)** Eficiência, para que os recursos de saúde sejam aplicados de maneira a reduzir custos e otimizar o atendimento em todas as regiões da cidade.
- C)** Universalidade, para que todos os cidadãos, independentemente de onde moram, possam ter acesso aos mesmos serviços de saúde sem qualquer forma de discriminação.
- D)** Equidade, para que a distribuição dos serviços de saúde leve em conta as necessidades específicas da comunidade em relação aos casos de diabetes, proporcionando a essa população maior atenção e recursos de saúde.
-

Questão 98

CERMAN | AM | 2025

Em qual modalidade de Atenção Domiciliar encontram-se as pessoas com problemas de saúde e dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma UBS, com maior frequência de cuidado, recursos de saúde e acompanhamento contínuo e uso de equipamentos ou agregação de procedimentos de maior complexidade (ventilação mecânica, paracentese de repetição, nutrição parenteral, transfusão sanguínea)?

- A)** AD1.
- B)** AD2.
- C)** AD3.
- D)** Nenhuma modalidade, pois essas pessoas não necessitam de Atenção Domiciliar.
-

Questão 99

CERMAN | AM | 2025

João, de 52 anos, foi ao posto de saúde para uma consulta de rotina e, após uma avaliação, o médico solicitou a realização de exames de sangue e uma colonoscopia para investigar possíveis sinais precoces de doenças. João não apresenta sintomas, mas, devido à sua idade e histórico familiar, ele tem um risco aumentado para algumas doenças crônicas. A estratégia

utilizada pelo médico, ao solicitar esses exames, é um exemplo de qual tipo de prevenção?

- A)** Prevenção primária.
- B)** Prevenção secundária.
- C)** Prevenção terciária.
- D)** Prevenção quaternária.

Questão 100

CERMAN | AM | 2025

O controle social é um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) e permite que a sociedade participe diretamente da formulação, gestão e fiscalização das políticas públicas de saúde. Para garantir essa participação, o SUS conta com alguns espaços e mecanismos de controle social, como conselhos e conferências de saúde. Qual alternativa representa CORRETAMENTE um exemplo de controle social no SUS?

- A)** A participação de cidadãos em conselhos de saúde municipais, estaduais e nacional, onde podem discutir e influenciar as políticas públicas de saúde.
- B)** A criação de novas unidades de saúde pelo Ministério da Saúde, sem consulta à população.
- C)** A promoção de campanhas de vacinação pelo SUS para aumentar a cobertura vacinal da população.
- D)** A elaboração de pesquisas científicas para avaliar a eficácia de tratamentos oferecidos pelo SUS.