

# HNMD

2026 | RJ | 50 Questões



### Questão 1

HNMD | RJ | 2026

Uma mulher de 75 anos comparece em consulta se queixando de vertigem, desequilíbrio e surdez há 5 meses. Qual nervo craniano pode estar afetado?

- A) I
- B) III
- C) V
- D) VIII
- E) X

### Questão 2

HNMD | RJ | 2026

Entre as doenças e agravos abaixo, assinale aquela que NÃO é de notificação compulsória imediata (até 24 horas) para as Secretarias Municipais de Saúde.

- A) Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva.
- B) Acidente de trabalho grave sem exposição a material biológico.
- C) Infecção pelo HTLV em gestante, parturiente ou puérpera e criança exposta ao risco de transmissão vertical do HTLV.
- D) Violência sexual e tentativa de suicídio.
- E) Acidente por animal peçonhento.

### Questão 3

HNMD | RJ | 2026

Qual é o distúrbio do equilíbrio ácido-base esperado nos casos de cetoacidose diabética?

- A) Acidose metabólica de ânion gap normal.
- B) Alcalose metabólica hiperclorêmica.
- C) Acidose metabólica de ânion gap aumentado.
- D) Alcalose metabólica hipoclorêmica.
- E) Alcalose mista.

### Questão 4

HNMD | RJ | 2026

O medicamento mais utilizado no Brasil para emergência hipertensiva é o nitroprussiato de sódio. Esse fármaco é metabolizado em cianeto, que pode causar:

- A) alcalose metabólica.
- B) alcalose respiratória.
- C) alcalose mista.
- D) acidose respiratória.
- E) acidose metabólica.

### Questão 5

HNMD | RJ | 2026

Uma mulher de 34 anos, obesa e tabagista, fraturou o tornozelo direito há 10 dias e está com uma imobilização. Deu entrada no pronto-socorro com quadro de dispneia súbita há 1 hora, com piora progressiva. Ao exame, constata-se diminuição do murmúrio vesicular à direita, esforço respiratório, SatO<sub>2</sub>: 80% em ar ambiente, pressão arterial 80x60mmhg, frequência cardíaca 120 bpm. Tomografia de tórax com contraste revela falha de enchimento em artéria pulmonar direita. Qual é o tratamento mais adequado para a paciente?

- A) Anticoagulação terapêutica.
- B) Antibioticoterapia.
- C) Trombólise.
- D) Anti-inflamatório.
- E) Antiagregantes plaquetários.

---

### Questão 6

HNMD | RJ | 2026

Na avaliação de um paciente vítima de trauma, qual é a primeira conduta a ser tomada?

- A) Provocar resposta verbal e proteger coluna cervical.
- B) Máscara laríngea.
- C) Expor todo o paciente.
- D) Mobilizar todas as extremidades.
- E) Oximetria de pulso.

---

### Questão 7

HNMD | RJ | 2026

Um teste foi desenvolvido para detectar tuberculose em 400 pacientes com diagnóstico de vírus da imunodeficiência humana (HIV). Dos 400 indivíduos, 160 realmente tinham tuberculose, mas apenas 120 deles testaram positivo. Entre os indivíduos que não tinham tuberculose, 60 testaram positivo. Com base nesses dados, assinale a alternativa que apresenta o percentual de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP) e valor preditivo negativo (VPN) do teste, respectivamente.

- A) 67 / 82 / 75 / 75
- B) 75 / 75 / 67 / 82
- C) 75 / 80 / 75 / 80
- D) 80 / 70 / 60 / 90
- E) 85 / 85 / 80 / 90

---

### Questão 8

HNMD | RJ | 2026

Entre as estratégias e definições do Sistema Único de Saúde (SUS), podemos citar:

- A)** a estratégia de saúde da família (ESF), que em 2017 já estava presente em 97,5% dos municípios, com uma cobertura de 146 milhões de pessoas.
- B)** a alocação de recursos pelo Governo Federal, que se baseia em 5 blocos de custeio. São eles: atenção básica, atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, vigilância à saúde, assistência social e gestão do SUS.
- C)** a lei 8.080/90, que regulamenta a participação da comunidade, bem como as transferências intergovernamentais de recursos financeiros.
- D)** a coordenação do cuidado como um dos elementos essenciais da atenção primária em saúde, sendo relacionada com a vinculação da equipe de atenção primária à população adscrita com implicações no acompanhamento das pessoas ao longo de seu ciclo de vida.
- E)** os profissionais que operam na estratégia de saúde da família (ESF) e devem procurar compreender a dinâmica sociocultural do território onde atuam, não cabendo-lhes porém intervir em situações conflituosas.

---

### Questão 9

HNMD | RJ | 2026

Uma paciente de 10 semanas de gestação chega ao pronto-socorro com sangramento vaginal moderado e dor em cólica. Ao exame especular, o colo está fechado. Ultrassonografia mostra embrião com batimentos cardíacos e descolamento trofoblástico. Qual o diagnóstico mais provável?

- A)** Abortamento completo.
- B)** Abortamento retido.
- C)** Abortamento inevitável.
- D)** Ameaça de abortamento.
- E)** Mola hidatiforme.

---

### Questão 10

HNMD | RJ | 2026

Uma gestante G2P1A0, com 28 semanas de gestação, comparece ao pré-natal com histórico de parto anterior com recém-nascido icterico que necessitou de exanguinotransfusão. Na gestação atual, é Rh negativa, Coombs indireto positivo (título 1:64) e o parceiro é Rh positivo. A ultrassonografia obstétrica com Doppler mostra velocidade da artéria cerebral média (ACM) com pico sistólico de 1,65 MoM. Qual a conduta mais adequada neste momento?

- A)** Administrar imunoglobulina anti-D (Rhogan) e repetir o Doppler da ACM em 2 semanas.
- B)** Realizar cordocentese para avaliação do hematócrito fetal e, se necessário, transfusão intrauterina.
- C)** Antecipar o parto imediatamente, pois há risco iminente de óbito fetal.
- D)** Iniciar corticoide antenatal e planejar parto com 32 semanas.
- E)** Aguardar evolução espontânea, pois o valor de 1,65 MoM está dentro da normalidade para idade gestacional.

---

### Questão 11

HNMD | RJ | 2026

Em relação à asma, assinale a alternativa INCORRETA.

- A)** A asma não pode estar presente em pacientes com espirometria normal ou sem resposta broncodilatadora significativa.
- B)** A avaliação funcional da asma é feita através da espirometria.
- C)** A confirmação do diagnóstico de asma, usualmente, é feita através da espirometria.
- D)** A exacerbação grave pode estar presente em pacientes com doença basal com baixa severidade.
- E)** O critério espirométrico é o volume expiratório forçado no 1º segundo sobre a capacidade vital forçada (VEF1/CVF) reduzido com aumento maior ou igual 12% e 200mL no VEF1 ou CVF após broncodilatador.

---

### Questão 12

HNMD | RJ | 2026

Em relação à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), assinale a alternativa correta.

- A)** A espirometria não é essencial para confirmar o diagnóstico.
- B)** A DPOC é uma doença frequente, prevenível e tratável. É heterogênea em sua apresentação clínica e evolução e caracterizada por obstrução ao fluxo de ar, persistente e geralmente progressiva.
- C)** O aumento de  $\alpha$ -1-antitripsina (AAT) é uma doença hereditária associada a altos níveis da proteína AAT, o que pode levar ao desenvolvimento de enfisema precoce.
- D)** A DPOC, uma vez diagnosticada, é curável.
- E)** Parar de fumar aumenta a sobrevida, reduz a mortalidade, mas não retarda a progressão da doença.

---

### Questão 13

HNMD | RJ | 2026

Um mulher múltipara em trabalho de parto, com apresentação cefálica, já com dilatação completa, inicia a fase de expulsão. O feto encontra-se em posição occipital posterior, o que pode dificultar a progressão do parto. Qual das alternativas a seguir descreve corretamente o mecanismo compensatório que o feto realiza para facilitar a passagem pelo canal vaginal?

- A)** Flexão exagerada do pescoço para aumentar o diâmetro do plano de saída.
- B)** Rotação interna da cabeça para occipital anterior e posterior à saída da cabeça.
- C)** Extensão da cabeça combinada com rotação externa após a saída da cabeça.
- D)** Rotação externa antes da saída do ombro para alinhar com o eixo da pelve.
- E)** Flexão do tronco para facilitar a passagem pelo estreito médio.

---

### Questão 14

HNMD | RJ | 2026

Uma gestante assintomática realizou um teste para toxoplasmose com resultado de IgM reagente isoladamente, após apresentar 2 testes anteriores negativos para IgM e IgG. Ela

iniciou tratamento específico e após 3 semanas realizou novo teste, cujo resultado foi negativo para ambas imunoglobulinas. O que ocorreu nesse caso?

- A) Confusão.
- B) Causalidade reversa.
- C) Erro tipo I.
- D) Erro tipo II.
- E) Infecção aguda por toxoplasma.

---

### Questão 15

HNMD | RJ | 2026

Em relação a imunizações podemos afirmar que:

- A) as vacinas conjugadas apresentam importante vantagem no controle das doenças por levar à proteção de rebanho: ao reduzirem o estado de portador sadio, por meio da imunidade de mucosa, protegem as pessoas não vacinadas à medida que as vacinadas deixam de transmitir a bactéria.
- B) vacinas de RNA mensageiro e de vetores virais não replicantes codificam proteína antigênica, estimulando resposta imune. Essas técnicas não são consideradas inócuas.
- C) as vacinas de vírus vivos devem ser administradas de 14 a 30 dias antes da introdução e somente após seis meses do término da terapia imunodepressora com ciclosporina.
- D) em acidente botrópico que apresente edema e equimose evidente é recomendada a aplicação de 12 unidades de soro antibotrópico pentavalente.
- E) a via de administração da vacina influenza trivalente, fragmentada e inativada, é obrigatória por via intramuscular.

---

### Questão 16

HNMD | RJ | 2026

Qual dos seguintes tumores benignos do esôfago é mais comum e apresenta predominância no sexo masculino?

- A) Leiomioma.
- B) Schwannoma.
- C) Hemangioma.
- D) Papiloma escamoso.
- E) Neurofibroma.

---

### Questão 17

HNMD | RJ | 2026

A principal causa de parada cardiorrespiratória em crianças é a hipóxia tecidual levando à assistolia. Porém, existem ritmos em que é necessário o uso de desfibriladores. Assinale a alternativa que apresenta ritmos considerados chocáveis e a potência inicial mínima da carga a ser colocada no desfibrilador, em Joules (J) /Kilo (Kg).

- A) Atividade elétrica sem pulso e Taquiverricular sem pulso, 2J/Kg.

- B)** Assistolia e Atividade elétrica sem pulso, 0,5J/Kg.
- C)** Fibrilação ventricular e Atividade elétrica sem pulso, 2J/Kg.
- D)** Fibrilação ventricular e Taquiventricular sem pulso, 2J/Kg.
- E)** Fibrilação ventricular e Taquiventricular sem pulso, 0,5J/Kg.

---

### Questão 18

HNMD | RJ | 2026

Um rapaz de 20 anos queixa-se de tosse e hemoptise há 5 dias, evoluindo com dispneia aos mínimos esforços e ortopneia. Observa-se, na ausculta cardíaca, um sopro diastólico rude na região do ápice do coração. Qual é a provável valvopatia desse rapaz?

- A)** Insuficiência mitral.
- B)** Insuficiência aórtica.
- C)** Estenose tricúspide.
- D)** Estenose aórtica.
- E)** Estenose mitral.

---

### Questão 19

HNMD | RJ | 2026

Qual alteração a seguir está presente na Síndrome de Lise Tumoral?

- A)** Hipouricemia.
- B)** Hipofosfatemia.
- C)** Hipercalemia.
- D)** Hipocalemia.
- E)** Hipercalcemia.

---

### Questão 20

HNMD | RJ | 2026

Um paciente de 3 anos, foi internado na unidade de terapia intensiva (UTI) Pediátrica, intubado e ventilando com parâmetros elevados, começa a apresentar queda de saturação e bradicardia. A Equipe de enfermagem chama a médica que está de plantão na UTI Pediátrica. Começam a ventilar manualmente o paciente com bolsa a 100%, obtendo melhora da cor, frequência cardíaca e saturação. A médica realiza aspiração do tubo sem saída de secreção significativa e a sonda passa sem dificuldade, checa o tamanho e posição de tubo orotraqueal (TOT) sem alteração e realiza ausculta respiratória evidenciando murmúrio reduzido em hemitórax direito, hipertimpânico a percussão e expansibilidade reduzida a direita. Qual foi a causa da piora súbita da criança?

- A)** Deslocamento do TOT.
- B)** Obstrução do TOT.
- C)** Pneumotórax a D.
- D)** Equipamento (respirador) não funcionando adequadamente.
- E)** Atelectasia a D.

### Questão 21

HNMD | RJ | 2026

O diagnóstico de coagulação intravascular disseminada (CIVD) é baseado nos achados clínicos em combinação com parâmetros laboratoriais e somente pode ser feito se houver uma condição primária sabidamente associada a CIVD. Dentre os achados laboratoriais, qual NÃO está associado ao CIVD?

- A) Diminuição de fibrinogênio.
- B) Trombocitopenia.
- C) Tempo de protrombina prolongado.
- D) Diminuição de d-dímero.
- E) PTT prolongado.

### Questão 22

HNMD | RJ | 2026

Uma mulher de 68 anos, nulípara, com menarca aos 11 anos e menopausa aos 55, com mãe que teve câncer de mama aos 59 anos, procura atendimento para rastreamento de câncer de mama. Apresenta índice de massa corporal (IMC) de 32 kg/m<sup>2</sup>, não usa terapia hormonal e nunca realizou mamografia. Diante do cenário clínico e com base nos dados estatísticos consolidados, qual das alternativas abaixo expressa corretamente os principais fatores de risco epidemiológicos para o desenvolvimento do câncer de mama?

- A) A nuliparidade, obesidade e menarca precoce aumentam o risco, mas o fator mais relevante estatisticamente é o uso de contraceptivo oral por mais de 10 anos, que sozinho dobra o risco relativo para câncer de mama.
- B) A presença de história familiar de primeiro grau e a menarca precoce são fatores de risco independentes, mas o tabagismo é considerado fator de risco de maior magnitude, superando inclusive a densidade mamária aumentada.
- C) Fatores como nuliparidade, obesidade pós-menopausa, menopausa tardia e menarca precoce estão associados ao aumento de risco; a história familiar de câncer de mama em parente de primeiro grau antes dos 60 anos é um dos mais relevantes, dobrando aproximadamente o risco relativo.
- D) O principal fator de risco estatístico é a reposição hormonal combinada, que aumenta o risco absoluto anual em mais de 5%, sendo os demais fatores considerados de impacto clínico desprezível.
- E) A densidade mamária reduzida, nuliparidade e menopausa precoce são os principais preditores de risco aumentado para câncer de mama em mulheres acima dos 45 anos.

### Questão 23

HNMD | RJ | 2026

A prevenção de deficiência de vitamina D, conforme o Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, é realizada para todas as crianças:

- A) após o 6º mês de vida.
- B) após o 1º ano de vida.
- C) exceto se a criança estiver em aleitamento materno exclusivo.

- D) a partir do 7º dia de vida.
- E) ao nascimento.

---

### Questão 24

HNMD | RJ | 2026

Um homem de 70 anos, obeso e hipertenso, procura pronto-socorro por sensação de "batedeira" há 2 dias. Ao solicitar um eletrocardiograma (ECG), observa-se um ritmo irregular, frequência cardíaca em torno de 120 bpm, ausência de onda P, QRS estreito, sem sinais de sobrecarga ou isquemia. Somente pela descrição, é possível concluir que esse paciente possui:

- A) fibrilação atrial.
- B) extrassístoles.
- C) taquicardia sinusal.
- D) taquicardia ventricular.
- E) flutter atrial.

---

### Questão 25

HNMD | RJ | 2026

No fluxograma de abordagem do paciente com suspeita de apendicite, um paciente do sexo masculino com menos de 48 horas de sintomas, peritonite localizada e apresentação clínica clássica deve ser inicialmente submetido a:

- A) apendicectomia laparoscópica.
- B) tomografia computadorizada com contraste oral e endovenoso.
- C) ultrassonografia abdominal seriada.
- D) observação clínica com antibioticoterapia empírica.
- E) lavagem peritoneal diagnóstico e cultura.

---

### Questão 26

HNMD | RJ | 2026

Segundo a classificação de Hinchey, qual o achado característico do Estágio III da diverticulite complicada?

- A) Abscesso pericólico pequeno, confinado.
- B) Peritonite purulenta generalizada.
- C) Abscesso pélvico bloqueado, grande.
- D) Peritonite fecal generalizada.
- E) Fístula colovesical com abscesso.

---

### Questão 27

HNMD | RJ | 2026

Uma gestante de 24 anos, primigesta, 14 semanas, tem dieta pobre em laticínios, e não aparenta comorbidades. Durante consulta de pré-natal, a médica assistente propõe o uso profilático de carbonato de cálcio. Qual é a justificativa mais adequada?

- A) Prevenir anemia ferropriva.
- B) Reduzir risco de restrição de crescimento fetal.
- C) Prevenir pré-eclâmpsia em gestantes com baixa ingestão de cálcio.
- D) Aumentar níveis séricos de vitamina D.
- E) Corrigir hipocalcemia fisiológica da gravidez.

---

### Questão 28

HNMD | RJ | 2026

Uma paciente climatérica de 50 anos procura alívio para fogachos, sem histórico de doença tromboembólica, mas com história prévia de câncer de mama. Qual a melhor abordagem?

- A) Terapia Hormonal (TH) com estrógeno e progesterona.
- B) Tibolona.
- C) Inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina (ISRS) como venlafaxina.
- D) Estrogênio isolado.
- E) Terapia com base em fitoestrógenos.

---

### Questão 29

HNMD | RJ | 2026

Qual agente etiológico mais comum até os 2 meses de idade para pneumonia comunitária?

- A) *Streptococcus pneumoniae*.
- B) *Mycobacterium tuberculosis*.
- C) *Chlamydia pneumoniae*.
- D) *Mycoplasma pneumoniae*.
- E) *Chlamydia trachomatis*.

---

### Questão 30

HNMD | RJ | 2026

O traumatismo cranioencefálico (TCE) é um dos acidentes mais frequentes em pediatria. Os TCEs classificados como grave são aqueles onde a Escala de Coma de Glasgow (ECG) é menor ou igual a 8. O paciente que sofreu um acidente automobilístico e no momento do seu exame físico abre o olho em resposta a dor, apresenta-se falando sons incompreensíveis e com movimentos de decorticação, possui qual valor na ECG?

- A) 8
- B) 7
- C) 6
- D) 5
- E) 4

### Questão 31

HNMD | RJ | 2026

Qual das complicações abaixo está entre as mais graves e precoces após o bypass gástrico em Y de Roux laparoscópico, tendo a expertise do cirurgião uma influência significativa?

- A) Estenose anastomótica da enteroanastomose distal.
- B) Colelitíase associada à perda ponderal.
- C) Úlcera marginal em anastomose gastrojejunal.
- D) Fístula da anastomose proximal.
- E) Obstrução por corpo estranho na alça alimentar.

### Questão 32

HNMD | RJ | 2026

São exemplos de doenças de transmissão direta mediata, EXCETO:

- A) sarampo, tuberculose pulmonar e hanseníase.
- B) hepatite B, vírus da imunodeficiência humana e sarampo.
- C) hepatite B, vírus da imunodeficiência humana e herpes genital.
- D) vírus da imunodeficiência humana, herpes genital e esquistossomose mansônica.
- E) doença de Chagas, cólera e esquistossomose mansônica.

### Questão 33

HNMD | RJ | 2026

Segundo a 'regra dos nove' aplicada na avaliação de queimaduras, qual é a estimativa da porcentagem da área de superfície corporal total (ASCT) correspondente à face anterior do tronco de uma criança?

- A) 9
- B) 14
- C) 18
- D) 27
- E) 36

### Questão 34

HNMD | RJ | 2026

Um paciente de 2 anos, foi internado na unidade de terapia intensiva (UTI) Pediátrica com quadro de pneumonia comunitária há 2 dias, em ventilação mecânica invasiva. Os parâmetros ventilatórios são: pressão inspiratória 16 cmH<sub>2</sub>O (acima da PEEP) x PEEP 8 cmH<sub>2</sub>O x FR 25 irpm x tempo inspiratório 0,7 x FiO<sub>2</sub> 100%, gerando volume corrente de 7,5 mL/kg. Colhida a gasometria arterial: pH 7,30, pO<sub>2</sub> 90, pCO<sub>2</sub> 45, bicarbonato 18 mEq/L, Sat. O<sub>2</sub> 90%. Qual parâmetro ventilatório pode ser alterado para melhorar a oxigenação do paciente?

- A) Reduzir a frequência respiratória.
- B) Aumentar o volume corrente.

- C) Aumentar a PEEP.
  - D) Aumentar a pressão inspiratória.
  - E) Aumentar o tempo expiratório.
- 

### Questão 35

HNMD | RJ | 2026

São fatores que favorecem o aparecimento de doenças emergentes, EXCETO:

- A) tecnologia de processamento de alimentos em massa, possibilitando a contaminação da carne.
  - B) sistemas de ar condicionado, pois microrganismos crescem em biofilmes formados nos reservatórios onde a água se acumula.
  - C) transporte, viagens, migração e urbanização.
  - D) hábitos e costumes culturais.
  - E) desflorestamento distante de áreas urbanas e outras condições que favorecem o desenvolvimento de vetores e de reservatórios secundários.
- 

### Questão 36

HNMD | RJ | 2026

Em relação à abordagem do trauma esplênico, assinale a alternativa correta.

- A) A presença de líquido livre ao Focused Assessment with Sonography for Trauma (FAST) em paciente estável indica, necessariamente, laparotomia.
  - B) O baço raramente está envolvido nos traumas penetrantes.
  - C) A esplenectomia é a primeira escolha para todas as lesões esplênicas.
  - D) Pacientes instáveis com lesão esplênica devem ser levados imediatamente ao centro cirúrgico.
  - E) No trauma esplênico é essencial classificar o grau com tomografia antes de definir a conduta.
- 

### Questão 37

HNMD | RJ | 2026

Em relação aos estudos de caso controle, os principais vieses são:

- A) seleção e verificação.
  - B) seleção e confusão.
  - C) verificação e confusão.
  - D) seleção, verificação e confusão.
  - E) seleção e memória.
- 

### Questão 38

HNMD | RJ | 2026

Qual é a causa mais comum de hemorragia gastrointestinal baixa em adultos?

- A) Doença diverticular.
- B) Angiodisplasia.
- C) Neoplasias.
- D) Hemorroidas.
- E) Colite isquêmica.

---

### Questão 39

HNMD | RJ | 2026

Sobre o diabetes mellitus, assinale a alternativa correta.

- A) Glicemia aleatória maior ou igual a 200 mg/dl confirma o diagnóstico de diabetes mellitus em assintomáticos.
- B) Glicemia maior que 240mg/dl, uma hora após 75g de glicose oral confirma o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2.
- C) Teste de tolerância oral com 75 g de glicose e com glicemia maior ou igual a 200mg/dl em uma ocasião, em assintomáticos, confirma diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2.
- D) Hemoglobina glicada maior ou igual a 6%, em assintomático, confirma o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2.
- E) Glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg/dl, obtida em duas aferições em dias distintos, confirma o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2.

---

### Questão 40

HNMD | RJ | 2026

O metotrexato é um dos fármacos para tratamento da artrite reumatoide. Os efeitos adversos mais frequentemente observados são anemia, neutropenia, náuseas e vômitos, mucosite e elevação de enzimas hepáticas. A fim de minimizar efeitos adversos, sugere-se associação do metotrexato com:

- A) ácido fólico.
- B) vitamina C.
- C) carbonato de cálcio.
- D) vitamina D.
- E) magnésio.

---

### Questão 41

HNMD | RJ | 2026

Sobre o teste oral de tolerância à glicose (TOTG) de 75g na gestação, é correto afirmar que:

- A) deve ser realizado apenas em gestantes com fatores de risco.
- B) deve ser feito no primeiro trimestre em todas as gestantes.
- C) o diagnóstico de diabetes gestacional exige alteração em duas glicemias.
- D) não é recomendado para rastreio de diabetes gestacional.
- E) o teste é feito entre 24 e 28 semanas, com diagnóstico se apenas uma glicemia estiver

alterada.

---

### Questão 42

HNMD | RJ | 2026

De acordo com a classificação de Johnson para úlceras gástricas, qual tipo é mais frequentemente associado ao uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINES)?

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

---

### Questão 43

HNMD | RJ | 2026

Um homem de 84 anos marca uma consulta, pois está com uma tosse há 5 dias que não melhora com o xarope que está tomando em casa. A tosse, antes seca, começa a progredir com expectoração amarelada associada a picos febris recorrentes durante o dia. Na ausculta pulmonar, percebe-se estertores crepitantes em base esquerda. Qual é o provável diagnóstico do paciente?

- A) Tromboembolismo pulmonar.
- B) Pneumonia.
- C) Infarto agudo do miocárdio.
- D) Dissecção de aorta.
- E) Sinusite.

---

### Questão 44

HNMD | RJ | 2026

Uma pessoa de 17 anos é avaliada por amenorreia primária. Apresenta desenvolvimento mamário normal, pelos pubianos presentes e ausência de vagina ao exame físico. Ultrassonografia pélvica revela ausência de útero. Qual é o diagnóstico mais provável?

- A) Síndrome de Kallmann.
- B) Hiperplasia adrenal congênita.
- C) Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser.
- D) Síndrome de Morris.
- E) Disgenesia gonadal.

---

### Questão 45

HNMD | RJ | 2026

Uma mulher de 27 anos, sexualmente ativa, relata dor abdominal inferior há 3 dias, febre e

corrimento vaginal purulento. Ao exame, paciente encontra-se estável hemodinamicamente, sendo observado dor à palpação em hipogástrio, secreção endocervical purulenta e dor à mobilização do colo uterino. Qual é a conduta inicial mais apropriada?

- A) Solicitar laparoscopia diagnóstica.
- B) Iniciar antibioticoterapia empírica ambulatorial.
- C) Aguardar cultura vaginal antes de iniciar antibiótico.
- D) Internar para antibioticoterapia venosa e avaliação cirúrgica.
- E) Solicitar ultrassonografia transvaginal com doppler.

---

### Questão 46

HNMD | RJ | 2026

Um lactente de 2 meses, sem internações prévias, apresenta quadro, há 4 dias, de coriza hialina e tosse. É levado à Emergência por apresentar piora da tosse e cansaço. A mãe nega febre e refere que o irmão mais velho está com resfriado. Ao exame físico, apresenta-se em regular estado geral, hidratado, corado, afebril, taquidispneico, com frequência respiratória de 67 irpm e uso de musculatura acessória. Apresenta roncos e sibilos difusos à ausculta pulmonar. O restante do exame físico é normal. Radiografia de tórax com sinais de hiperinsuflação, sem imagem de condensação e/ou atelectasia. Qual é o agente etiológico do quadro acima?

- A) Bordetella pertussis.
- B) Chlamydia trachomatis.
- C) Mycoplasma pneumoniae.
- D) Vírus sincicial respiratório.
- E) Streptococcus pneumoniae.

---

### Questão 47

HNMD | RJ | 2026

O tema referente aos Determinantes Sociais da Saúde (DSS) impõe-se como pauta importante na contemporaneidade a partir da relação estabelecida entre a saúde e as condições sociais em que as pessoas vivem. Acerca disso, assinale a assertiva INCORRETA.

- A) No Brasil, a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) compreende os determinantes como fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população.
- B) O relatório Lalonde, construído no Canadá em 1974 foi o primeiro relatório a reconhecer a mudança no paradigma biomédico de seu Sistema Nacional de Saúde trazendo novas perspectivas de enfrentamento do processo saúde-doença. A estratégia criada por Lalonde gerou uma significativa sinergia entre os determinantes e a saúde das pessoas, o que embasou a estratégia "Saúde para Todos no Ano 2000".
- C) Em 1978 foi realizada a reunião de Alma-Ata, que estabeleceu a doutrina da atenção primária, nela os DSS foram incluídos como um dos pilares básicos nesse nível de atenção.
- D) Em razão de toda conscientização sobre os DSS, atualmente se observa a materialização dos DSS nas políticas de saúde, nos modelos de desenvolvimento e

mesmo na concretude da vida das pessoas.

- E)** Em 2005 foi criada a Comissão sobre os Determinantes Sociais da Saúde pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

---

### Questão 48

HNMD | RJ | 2026

Sobre o coeficiente de mortalidade na infância, assinale a assertiva correta sobre o tema.

- A)** É medido a partir do número de óbitos de menores de 12 anos de idade dividido por 1.000 nascidos vivos na população residente em determinado espaço geográfico e ano.
- B)** O uso desse coeficiente tem por objetivos estimar a probabilidade que os nascidos vivos têm de morrer nos primeiros 2 anos de vida e avaliar, de maneira indireta, o desenvolvimento e a infraestrutura ambiental que potencializam a ocorrência de doenças ou agravos que podem causar a morte nesse grupo etário, e ainda, a qualidade e o acesso aos recursos disponíveis para a atenção materno-infantil.
- C)** Consta no quarto Objetivo do Milênio do UNICEF, que define redução de dois terços do coeficiente mundial entre 1990 e 2015.
- D)** As principais causas de morte estão associadas a uma combinação de fatores relacionados a condições de vida e de atenção à saúde, além de fatores socioeconômicos e ambientais. São mais importantes as doenças infecciosas e parasitárias e a desnutrição. Os acidentes, principalmente no ambiente doméstico, como quedas, intoxicações e queimaduras não se mostram tão determinantes ainda.
- E)** Dentre as limitações para o uso desse indicador, destaca-se a subnumeração de óbitos e de nascidos vivos para o cálculo direto do coeficiente, porém não demonstra impacto nas principais regiões do país ou nos estados.

---

### Questão 49

HNMD | RJ | 2026

Em pacientes com trauma penetrante de pescoço, na presença de sinais de gravidade de lesão arterial ou instabilidade hemodinâmica, o tratamento inicial adequado consiste em:

- A)** realizar apenas angiotomografia computadorizada do pescoço para avaliar necessidade de cirurgia.
- B)** endoscopia digestiva alta e broncoscopia para avaliação de lesão traqueoesofágica.
- C)** observação rigorosa e avaliação seriada com exame físico e exames laboratoriais.
- D)** assegurar via aérea, aplicar pressão direta e realizar cirurgia exploradora do pescoço.
- E)** encaminhar para embolização angiográfica e reavaliação em 24 horas.

---

### Questão 50

HNMD | RJ | 2026

Uma gestante de 34 semanas, G2P1, chega à emergência com sangramento vaginal indolor, em moderada quantidade, sem sinais de trabalho de parto. Ao exame físico, o colo está fechado e íntegro. Qual a principal hipótese diagnóstica e conduta inicial?

- A)** Descolamento prematuro de placenta; realizar toque vaginal.
- B)** Placenta prévia; evitar toque e solicitar ultrassonografia.
- C)** Ruptura uterina; preparar para cesariana imediata.
- D)** Parto prematuro iminente; prescrever betabloqueador.
- E)** Placenta acreta; solicitar ressonância magnética de pelve.