



# SESAPI

2026 | PI | 100 Questões



### Questão 1

SESAPI | PI | 2026

Mulher de 68 anos, hipertensa e diabética, dá entrada no PS com dor torácica típica há 2 horas. ECG mostra supra de ST em DII, DIII e aVF. A melhor conduta inicial é:

- A) Trombólise intravenosa, independentemente do tempo
- B) AAS, inibidor de P2Y12 e encaminhamento para angioplastia primária
- C) Nitrato sublingual e observação clínica
- D) Betabloqueador intravenoso isolado
- E) Encaminhamento para cirurgia de revascularização miocárdica de emergência.

### Questão 2

SESAPI | PI | 2026

Paciente com fibrilação atrial permanente,  $CHA_2DS_2-VA = 4$ ,  $HAS-BLED = 2$ , TFG 22 ml/min. A anticoagulação mais adequada é:

- A) Varfarina com INR alvo 2-3
- B) Dabigatrana em dose plena
- C) Rivaroxabana contraindicada
- D) Nenhuma anticoagulação está indicada
- E) Apixabana 5 mg duas vezes ao dia.

### Questão 3

SESAPI | PI | 2026

Paciente de 55 anos apresenta síncope súbita durante esforço físico. ECG mostra intervalo QT prolongado. A principal causa de morte associada a essa condição é:

- A) Assistolia
- B) Fibrilação ventricular por torsades de pointes
- C) Taquicardia supraventricular
- D) Bloqueio atrioventricular total
- E) Embolia pulmonar maciça.

### Questão 4

SESAPI | PI | 2026

Em relação à estenose aórtica grave, é critério diagnóstico de gravidade:

- A) Área valvar menor que 1,0 cm<sup>2</sup>
- B) Gradiente médio menor que 20 mmHg
- C) Velocidade do jato menor que 3 m/s
- D) Ausência de sintomas
- E) Gradiente médio de 30 mmHg.

### Questão 5

SESAPI | PI | 2026

Em um ensaio clínico randomizado, o cegamento tem como principal objetivo reduzir:

- A) Viés de seleção
- B) Viés de aferição (mensuração)
- C) Viés de confusão
- D) Erro amostral
- E) Viés de memória (recordação).

### Questão 6

SESAPI | PI | 2026

Em um estudo clínico randomizado, a análise por intenção de tratar tem como principal vantagem:

- A) Reduzir viés de aferição
- B) Aumentar o poder estatístico
- C) Preservar os benefícios da randomização
- D) Eliminar fatores de confusão residuais
- E) Eliminar a necessidade de grupo controle.

### Questão 7

SESAPI | PI | 2026

Paciente HIV, CD4 = 45 células/mm<sup>3</sup>, em TARV irregular, apresenta febre, perda ponderal, hepatoesplenomegalia e pancitopenia. O agente etiológico mais provável é:

- A) Mycobacterium tuberculosis
- B) Histoplasma capsulatum
- C) Citomegalovírus
- D) Toxoplasma gondii
- E) Sarcoma de Kaposi visceral.

### Questão 8

SESAPI | PI | 2026

Homem de 40 anos, internado há 10 dias em UTI, desenvolve pneumonia associada à ventilação mecânica. Qual esquema empírico é mais adequado?

- A) Ceftriaxona + azitromicina
- B) Amoxicilina-clavulanato
- C) Piperacilina-tazobactam + vancomicina
- D) Levofloxacino isolado
- E) Ciprofloxacino isolado.

### Questão 9

SESAPI | PI | 2026

Qual achado é característico da síndrome nefrótica?

- A) Hematúria dismórfica
- B) Proteinúria maior que 3,5 g/dia
- C) Oligúria persistente
- D) Hipertensão grave precoce
- E) Piúria estéril.

### Questão 10

SESAPI | PI | 2026

Paciente com DRC estágio 4 apresenta pH 7,28,  $\text{HCO}_3^-$  14 mEq/L e ânion gap normal. O distúrbio é:

- A) Acidose metabólica com ânion gap elevado
- B) Acidose metabólica hiperclorêmica
- C) Alcalose metabólica
- D) Acidose respiratória crônica
- E) Alcalose respiratória compensada.

### Questão 11

SESAPI | PI | 2026

Um homem de 78 anos apresenta-se para avaliação geriátrica. De acordo com o Fenótipo de Fragilidade de Fried, qual conjunto de achados confirmaria o diagnóstico de fragilidade?"

- A) Perda de peso não intencional, exaustão autorreferida e redução da força de preensão palmar.
- B) Idade superior a 80 anos, polifarmácia (5+ medicamentos) e déficit cognitivo.
- C) Dependência em atividades básicas de vida diária e histórico de quedas no último ano.
- D) Presença de pelo menos três doenças crônicas e isolamento social.
- E) Lentidão na velocidade da marcha associada exclusivamente a déficit auditivo e visual.

### Questão 12

SESAPI | PI | 2026

Mulher de 28 anos, com queixa de pica e fadiga, apresenta: Hb 9,5 g/dL, VCM 72 fL, RDW 18%, Ferritina 8 ng/mL e TIBC elevada. Qual achado laboratorial ajudaria a diferenciar este quadro de uma Talassemia Menor?

- A) O RDW estaria elevado na talassemia, ao contrário da anemia ferropriva.
- B) A ferritina na talassemia costuma estar normal ou elevada, enquanto o RDW é geralmente normal.
- C) A eletroforese de hemoglobina é o teste de triagem inicial preferível à ferritina.
- D) A presença de hipocromia exclui o diagnóstico de talassemia.

- E)** O ferro sérico estaria obrigatoriamente reduzido em ambos os casos.
- 

### Questão 13

SESAPI | PI | 2026

Mulher de 35 anos apresenta perda visual monocular súbita e dor ocular à movimentação. RM mostra lesão desmielinizante. O diagnóstico mais provável é:

- A)** Neuropatia óptica isquêmica
  - B)** Neurite óptica
  - C)** Glaucoma agudo
  - D)** Retinopatia diabética
  - E)** Descolamento de retina.
- 

### Questão 14

SESAPI | PI | 2026

Entre as causas abaixo, qual representa uma forma potencialmente reversível de demência?

- A)** Doença de Alzheimer
  - B)** Demência vascular
  - C)** Hidrocefalia de pressão normal
  - D)** Demência frontotemporal
  - E)** Doença de Corpos de Lewy.
- 

### Questão 15

SESAPI | PI | 2026

Paciente com diabetes tipo 1 apresenta vômitos, desidratação, hálito cetônico e Ph arterial de 7,1. A conduta inicial correta é:

- A)** Insulina subcutânea isolada
  - B)** Reposição volêmica e insulina intravenosa
  - C)** Administração imediata de bicarbonato
  - D)** Restrição hídrica
  - E)** Administração de glicose hipertônica (50%).
- 

### Questão 16

SESAPI | PI | 2026

O hipotireoidismo subclínico é caracterizado por:

- A)** TSH reduzido e T4 livre reduzido
- B)** TSH elevado e T4 livre normal
- C)** TSH normal e T4 livre reduzido
- D)** TSH suprimido e T4 elevado

E) TSH normal e T4 livre elevado.

---

### Questão 17

SESAPI | PI | 2026

Em paciente com síndrome de Cushing ACTH-dependente, o teste que diferencia doença de Cushing de produção ectópica de ACTH é:

- A) Dosagem de cortisol urinário
  - B) Teste de supressão com dexametasona baixa
  - C) Teste de dexametasona em alta dose
  - D) Dosagem isolada de ACTH
  - E) Cateterismo de seios petrosos inferiores com estímulo de CRH.
- 

### Questão 18

SESAPI | PI | 2026

Paciente tabagista apresenta dispneia crônica, com VEF1 reduzido e relação VEF1/CVF < 70% após broncodilatador. O diagnóstico mais provável é:

- A) Asma
  - B) DPOC
  - C) Fibrose pulmonar
  - D) Bronquiectasia
  - E) Insuficiência cardíaca esquerda.
- 

### Questão 19

SESAPI | PI | 2026

Paciente com dispneia progressiva, TCAR mostrando faveolamento e bronquiectasias de tração. O diagnóstico mais provável é:

- A) Asma grave
  - B) Fibrose pulmonar idiopática
  - C) Sarcoidose
  - D) Pneumonite por hipersensibilidade
  - E) Derrame pleural recidivante.
- 

### Questão 20

SESAPI | PI | 2026

Paciente em ventilação mecânica apresenta hipoxemia refratária ( $PaO_2/FiO_2 < 100$ ) apesar de PEEP elevada. A estratégia com maior impacto em mortalidade é:

- A) Aumento do volume corrente
- B) Manobra de recrutamento alveolar repetida



- C) Ventilação em posição prona
- D) Óxido nítrico inalatório
- E) Inalação de salbutamol de horário.

---

### Questão 21

SESAPI | PI | 2026

Qual é o papel principal das catecolaminas (adrenalina/noradrenalina) na resposta imediata ao trauma?

- A) Promover hipoglicemia por aumento da captação de glicose.
- B) Induzir glicogenólise, gliconeogênese e aumento do débito cardíaco para resposta de “luta/escape”.
- C) Supressão completa do eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal.
- D) Redução da lipólise.
- E) Inibição da secreção de insulina e estimulação da secreção de glucagon.

---

### Questão 22

SESAPI | PI | 2026

Em relação à nutrição enteral no pós-operatório, é correto afirmar que:

- A) Deve ser iniciada somente após o 5º dia.
- B) É contraindicada em pacientes intubados.
- C) Deve ser iniciada precocemente quando possível, idealmente nas primeiras 24–48h.
- D) Aumenta a taxa de fístulas intestinais.
- E) É preferível à nutrição parenteral por manter a integridade da barreira mucosa e reduzir a translocação bacteriana.

---

### Questão 23

SESAPI | PI | 2026

Após grandes perdas gastrintestinais (vômitos, drenagem gástrica), o distúrbio mais comum é:

- A) Acidose metabólica.
- B) Alcalose metabólica e hipocloremia.
- C) Hipercalemia.
- D) Hipermagnesemia.
- E) Alcalose metabólica hipoclorêmica, hipocalêmica e com acidúria paradoxal.

---

### Questão 24

SESAPI | PI | 2026

Qual dos fatores abaixo prolonga a fase inflamatória e piora a cicatrização?

- A) Hiperglicemia.
  - B) Suplementação proteica.
  - C) Oxigenação adequada.
  - D) Temperatura local adequada.
  - E) Uso crônico de corticosteroides e presença de tecidos desvitalizados.
- 

### Questão 25

SESAPI | PI | 2026

O principal risco associado ao uso de drenos abertos (ex.: Penrose) é:

- A) Hemorragia.
  - B) Infecção ascendente.
  - C) Formação de fístulas.
  - D) Retardo na cicatrização por segunda intenção.
  - E) Necrose de pele por contato com o fluido drenado.
- 

### Questão 26

SESAPI | PI | 2026

Sobre o uso prolongado de antibiótico profilático (por mais de 24h), é correto afirmar:

- A) Reduz significativamente risco de infecção.
  - B) É recomendado em cirurgias limpas.
  - C) Aumenta resistência bacteriana sem benefício adicional.
  - D) Deve ser sempre utilizado em idosos.
  - E) Deve ser estendido por 7 dias em casos de implante de próteses ortopédicas.
- 

### Questão 27

SESAPI | PI | 2026

A tríade letal do trauma inclui:

- A) Hipotermia, hipoglicemia e coagulopatia.
  - B) Acidose, hipotermia e coagulopatia.
  - C) Acidose, alcalose e hipotermia.
  - D) Hipercalcemia, acidose e hipotermia.
  - E) Hipotensão permissiva, acidose e hipercalemia.
- 

### Questão 28

SESAPI | PI | 2026

A classificação de Hinchey refere-se à gravidade de:

- A) Pancreatite.
- B) Diverticulite.

- C) Apendicite.
  - D) Colecistite.
  - E) Obstrução intestinal por volvo de sigmoide.
- 

### Questão 29

SESAPI | PI | 2026

Em um paciente instável com trauma abdominal fechado, o exame inicial preferido é:

- A) Tomografia computadorizada.
  - B) FAST.
  - C) Radiografia de abdome agudo.
  - D) Laparoscopia exploradora.
  - E) Lavado peritoneal diagnóstico (LPD).
- 

### Questão 30

SESAPI | PI | 2026

No trauma abdominal penetrante, a presença de evisceração implica:

- A) Observação por 24h.
  - B) Antibioticoterapia e alta.
  - C) FAST e TC antes de qualquer conduta.
  - D) Laparotomia imediata.
  - E) Redução manual no pronto-socorro e curativo compressivo.
- 

### Questão 31

SESAPI | PI | 2026

Qual o melhor tratamento para ruptura esplênica grau I-II em paciente estável:

- A) Laparotomia de emergência com esplenectomia total.
  - B) Laparotomia eletiva com esplenorrafia.
  - C) Tratamento não operatório com observação e exames seriados.
  - D) Esplenectomia parcial.
  - E) Arteriografia com embolização de artéria esplênica.
- 

### Questão 32

SESAPI | PI | 2026

Qual o sinal clássico de trombose venosa profunda (TVP) proximal:

- A) Sinal de Homans.
- B) Edema assimétrico de membro.
- C) Dor à palpação plantar.
- D) Varizes proeminentes.

- E)** Cacifo positivo bilateral e cianose fixa.
- 

### Questão 33

SESAPI | PI | 2026

Em nódulos tireoidianos, a indicação de punção aspirativa por agulha fina (PAAF) baseia-se principalmente em:

- A)** Idade e sexo.
  - B)** Presença de dor.
  - C)** Critérios ultrassonográficos e tamanho.
  - D)** História familiar de obesidade.
  - E)** Níveis elevados de tireoglobulina sérica.
- 

### Questão 34

SESAPI | PI | 2026

O nível de CEA (antígeno carcinoembrionário) é especialmente útil no:

- A)** Diagnóstico precoce do câncer gástrico.
  - B)** Estadiamento inicial do câncer de cólon.
  - C)** Seguimento pós-operatório do câncer colorretal.
  - D)** Rastreamento populacional de CCR.
  - E)** Diagnóstico diferencial entre pólipos hiperplásicos e adenomatosos.
- 

### Questão 35

SESAPI | PI | 2026

Assinale a principal característica do adenocarcinoma de esôfago:

- A)** Origina-se de células escamosas.
  - B)** É mais comum em asiáticos.
  - C)** Surge sobre mucosa metaplásica de Barrett.
  - D)** É mais frequente no terço superior do esôfago.
  - E)** Está fortemente associado ao tabagismo e consumo de bebidas quentes.
- 

### Questão 36

SESAPI | PI | 2026

O tumor benigno mais comum do fígado é:

- A)** Hepatocarcinoma.
  - B)** Hemangioma.
  - C)** Adenoma hepático.
  - D)** Hiperplasia nodular focal.
  - E)** Cisto hidático.
-

### Questão 37

SESAPI | PI | 2026

O melhor exame não invasivo para diagnóstico de litíase do ducto colédoco é:

- A) Ultrassom abdominal.
- B) Tomografia computadorizada de abdome superior.
- C) CPRE diagnóstica (colangiopancreatografia retrógrada endoscópica).
- D) Colangiorressonância (MRCP).
- E) Cintilografia biliar (HIDA scan).

### Questão 38

SESAPI | PI | 2026

Em relação ao tratamento das hérnias, a indicação de cirurgia emergencial é obrigatória em:

- A) Hérnia umbilical sintomática.
- B) Hérnia incisional grande.
- C) Hérnia inguinal estrangulada.
- D) Hérnia inguinal redutível.
- E) Hérnia de hiato tipo I (deslizamento).

### Questão 39

SESAPI | PI | 2026

Em relação ao manejo inicial do pneumotórax espontâneo primário, qual conduta é mais adequada em um paciente jovem, estável e com pneumotórax pequeno (<20%)?

- A) Toracotomia com sutura de bolhas apicais.
- B) Drenagem torácica com selo d'água.
- C) Observação com repetição de imagem.
- D) Pleurodese química imediata.
- E) Aspiração manual com agulha fina de alívio.

### Questão 40

SESAPI | PI | 2026

Qual é o distúrbio eletrolítico clássico da estenose hipertrófica do piloro não tratada?

- A) Acidose metabólica hiperclorêmica.
- B) Alcalose metabólica hipoclorêmica.
- C) Hipercalemia.
- D) Hiponatremia com acidose.
- E) Alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica.

### Questão 41

SESAPI | PI | 2026

Mulher de 32 anos, G3P1A1, apresenta gestação de 7 semanas com sangramento leve. A ultrassonografia mostra saco gestacional implantado na região do corno uterino direito, com miométrio periférico reduzido. Esse tipo de implantação anômala é mais associado a:

- A) Risco aumentado de pré-eclâmpsia precoce
- B) Rotura uterina precoce e hemorragia catastrófica
- C) Malformações fetais maiores
- D) Hidropisia fetal não imune
- E) Insuficiência placentária com CIUR grave no 1º trimestre

---

### Questão 42

SESAPI | PI | 2026

Em circunstâncias normais, o líquido amniótico sofre renovação contínua. Na segunda metade da gestação, o principal fator responsável pela manutenção do volume adequado de líquido amniótico é:

- A) A secreção ativa das membranas coriônicas
- B) A deglutição fetal e a diurese fetal em equilíbrio
- C) O transporte transplacentário direto de fluidos maternos
- D) A produção de líquido amniótico pelo ducto onfalomesentérico
- E) A ultrafiltração do líquido cérebro-espinhal fetal

---

### Questão 43

SESAPI | PI | 2026

Uma gestante de 28 semanas, previamente hígida, apresenta dispnéia leve aos esforços. No pré-natal, o ecocardiograma materno é normal. A ausculta revela sopro sistólico ejetivo grau II/VI em foco pulmonar. Considerando as adaptações fisiológicas maternas da gestação, qual achado é esperado e fisiológico nesse período?

- A) Redução do volume plasmático e aumento da viscosidade sanguínea
- B) Queda da resistência vascular sistêmica e aumento de 40–50% do débito cardíaco
- C) Diminuição progressiva da frequência cardíaca materna
- D) Redução da filtração glomerular em cerca de 50%
- E) Aumento da resistência vascular sistêmica devido ao efeito da progesterona

---

### Questão 44

SESAPI | PI | 2026

Gestante de 29 anos, 31 semanas, apresenta PA 170/115 mmHg, cefaleia intensa e epigastralgia. Exames laboratoriais: plaquetas 85.000/mm<sup>3</sup>, TGP 130 U/L, DHL 820 U/L. O quadro materno está mais consistentemente associado a qual alteração placentária fundamental?

- A) Aumento da invasão trofoblástica e redução da resistência das artérias espiraladas

- B)** Ausência de remodelamento adequado das artérias espiraladas com hipóxia placentária
- C)** Aumento do fluxo uteroplacentário por vasodilatação sistêmica
- D)** Redução do estresse oxidativo placentário
- E)** Hipervascularização placentária com macrosomia fetal

---

### Questão 45

SESAPI | PI | 2026

Uma gestante de 32 anos, G3P2, 30 semanas, portadora de lúpus eritematoso sistêmico com nefrite lúpica ativa, chega ao pronto atendimento com PA 170/115 mmHg, dor torácica, dispneia e saturação 86%. ECG mostra S1Q3T3, e angiotomografia revela Tromboembolismo pulmonar (TEP) central. O laboratório mostra plaquetas 75.000, TGO/TGP elevadas, DHL aumentada e creatinina 2,5 mg/dL. Evolui com convulsão tônico-clônica. Considerando as definições do CID MM (WHO), a classificação de causas de morte materna e a conduta prioritária em um cenário de TEP massivo associado a possível síndrome HELLP sobreposta, assinale a alternativa CORRETA:

- A)** O caso configura causa obstétrica direta, pois TEP na gestação sempre é classificado como direto; a prioridade é interrupção imediata da gestação antes de qualquer tratamento para o TEP.
- B)** A convulsão indica obrigatoriamente eclâmpsia e, portanto, o TEP não deve ser tratado até que o parto esteja concluído.
- C)** A associação de lúpus com pré-eclâmpsia/HELLP caracteriza exclusivamente causa indireta; assim, não é contabilizada na mortalidade materna obstétrica direta no sistema de vigilância epidemiológica.
- D)** A conduta definitiva deve ser trombólise plena imediatamente após a convulsão, mesmo sem estabilização materna, pois a gestação é contraindicação absoluta para trombólise.
- E)** O caso representa uma causa obstétrica indireta (Lúpus / TEP) associada a uma complicação obstétrica direta (HELLP), ambas elevando o risco de morte; a prioridade é anticoagulação plena e suporte intensivo materno antes de decidir pelo parto.

---

### Questão 46

SESAPI | PI | 2026

Uma gestante de 28 semanas, G2P1, chega à maternidade com queixa de contrações regulares a cada 6 minutos há 2 horas. Ao exame, colo com 2 cm de dilatação, 50% de esvaecimento, membranas íntegras. A ultrassonografia transvaginal mostra comprimento cervical de 18 mm. Sem sinais de infecção. Qual é a conduta mais adequada?

- A)** Administrar nifedipino para tocolise, iniciar corticóide para maturação pulmonar.
- B)** Realizar tocolise com indometacina, sem necessidade de corticoterapia por idade gestacional.
- C)** Indicar corticoterapia, mas evitar tocolíticos pelo achado da ultrassonografia.
- D)** Indicar interrupção da gestação devido risco elevado de parto iminente.
- E)** Iniciar antibiótico empírico e tocolise, mas não administrar sulfato de magnésio por idade gestacional <30 semanas.

### Questão 47

SESAPI | PI | 2026

Gestante de 22 semanas apresenta disúria, polaciúria e dor suprapúbica. Urina tipo 1 mostra leucocitúria, e urocultura revela *E. coli* >100.000 UFC/mL, sensível a nitrofurantoína e cefalexina, resistente a ampicilina. Sem febre ou dor lombar. Qual é a melhor conduta terapêutica?

- A) Tratar com nitrofurantoína por 7 dias, evitando cefalexina no 2º trimestre.
- B) Tratar com cefalexina por 3 dias, pois curso curto é equivalente na gestante.
- C) Iniciar nitrofurantoína por 7 dias, com urocultura de controle após o tratamento.
- D) Prescrever ciprofloxacino por 3 dias, primeira linha em gestantes sintomáticas.
- E) Iniciar apenas medidas comportamentais e repetir exame em 48 horas, pois não há febre.

### Questão 48

SESAPI | PI | 2026

Puérpera com 5 dias pós-parto vaginal apresenta febre de 38,8°C, lóquios fétidos e dor à palpação uterina. Ultrassom mostra cavidade uterina com conteúdo heterogêneo sugestivo de debris, sem retenção volumosa. O melhor manejo inicial é:

- A) Curetagem uterina imediata, mesmo sem sinais de retenção significativa.
- B) Iniciar antibiótico de amplo espectro (clindamicina + gentamicina) e reavaliar necessidade de esvaziamento.
- C) Administrar somente cefazolina, que cobre bem a flora anaeróbia envolvida.
- D) Prescrever antibiótico oral e manter ambulatorial, sem necessidade de internação.
- E) Antibiótico de amplo espectro e ocitocina, sem necessidade de avaliar a cavidade.

### Questão 49

SESAPI | PI | 2026

Paciente de 37 semanas, G3P2, com cesariana prévia única há 4 anos, entra em trabalho de parto. Dilatação 5 cm, bolsa íntegra, evolução adequada. Partograma adequado. A maternidade dispõe de equipe para assistência ao parto vaginal após cesárea (VBAC). Qual é a conduta mais apropriada?

- A) Indicar cesariana eletiva, pois toda cesariana prévia contraindica parto vaginal.
- B) Indicar cesariana devido risco absoluto de ruptura uterina em VBAC.
- C) Permitir tentativa de parto vaginal, com vigilância contínua.
- D) Indicar cesariana quando atingir plano +1, pela cicatriz uterina.
- E) Realizar amniotomia imediata para acelerar o trabalho e evitar ruptura uterina.

### Questão 50

SESAPI | PI | 2026

Gestante de 14 semanas procura atendimento referindo estupro ocorrido há 2 dias. Traz

boletim de ocorrência, mas está emocionalmente abalada e não deseja realizar exame pericial antes do procedimento. Relata certeza da decisão de interrupção. Segundo a legislação e diretrizes éticas brasileiras, qual é a conduta adequada?

- A)** A interrupção só pode ser realizada após exame pericial que comprove o estupro.
- B)** A interrupção pode ser realizada, desde que haja BO e avaliação psiquiátrica confirmando capacidade de decisão.
- C)** A interrupção pode ser realizada mesmo sem boletim de ocorrência ou exame pericial, desde que haja declaração da gestante.
- D)** A interrupção só pode ser feita até 12 semanas em casos de estupro no Brasil.
- E)** É obrigatória autorização judicial antes da interrupção.

---

### Questão 51

SESAPI | PI | 2026

Gestante de 35 semanas com diagnóstico de placenta prévia total recusa internação e deseja aguardar o trabalho de parto espontâneo em casa. Ela está orientada e compreende os riscos, inclusive a chance de hemorragia maciça e óbito. Qual é a conduta ética mais adequada?

- A)** Acionar imediatamente o comitê de ética e a polícia, pois a recusa é ilegal.
- B)** Solicitar que assine termo de responsabilidade, mas descontinuar totalmente o acompanhamento.
- C)** Manter a paciente internada mesmo contra vontade devido ao risco iminente.
- D)** Respeitar a autonomia, registrar detalhadamente a recusa e manter vínculo assistencial.
- E)** Determinar cesariana imediata, independentemente da recusa.

---

### Questão 52

SESAPI | PI | 2026

Gestante diabética pré-gestacional insulínica realiza ecocardiografia fetal com 24 semanas, que mostra hipertrofia septal moderada, função sistólica preservada e fluxo normal pelo ducto arterioso. Não há outras malformações. Qual conduta é mais apropriada?

- A)** Repetir o eco fetal apenas após o parto, pois hipertrofia septal não se modifica intraútero.
- B)** Orientar que a hipertrofia septal fetal é irreversível e requer interrupção precoce da gestação.
- C)** Ajustar controle glicêmico materno e programar reavaliação ecocardiográfica fetal no 3º trimestre.
- D)** Solicitar investigação genética urgente, pois o achado é típico de cardiopatia estrutural cromossômica.
- E)** Indicar uso de corticosteroide materno para reduzir a espessura septal.

---

### Questão 53

SESAPI | PI | 2026

Gestante de 8 semanas, previamente eutireoideana, apresenta TSH = 6,8 mUI/L, T4 livre

normal e anticorpo anti-TPO positivo. Sem sintomas. Qual é a melhor conduta?

- A)** Iniciar levotiroxina, pois trata-se de hipotireoidismo subclínico na gravidez com anti-TPO positivo.
- B)** Não tratar, pois apenas o T4 livre deve ser considerado no 1º trimestre.
- C)** Reavaliar em 4 semanas sem medicar, porque TSH<10 nunca indica tratamento gestacional.
- D)** Solicitar TRAb e tratar apenas se houver hipertireoidismo fetal.
- E)** Introduzir iodo suplementar em altas doses como alternativa à levotiroxina.

---

### Questão 54

SESAPI | PI | 2026

Uma paciente de 36 anos, nulípara, apresenta sangramento uterino anormal (SUA) há 8 meses. A ultrassonografia transvaginal mostra endométrio espessado e imagem sugestiva de pólipos de 1,3 cm. Está indicada histeroscopia diagnóstica. Durante o exame, observa-se cavidade com pólipo único sésil e vascularização escassa ao Doppler. Considerando as recomendações atuais, qual conduta é mais adequada?

- A)** Realizar apenas biópsia dirigida e aguardar resultado antes de remover o pólipo
- B)** Suspender o exame e programar polipectomia em centro cirúrgico sob anestesia geral
- C)** Realizar polipectomia ambulatorial com microtesoura ou sistema de ressecção mecânica (“morcelador”)
- D)** Tratar com progestagênio oral por 3 meses antes de qualquer intervenção histeroscópica
- E)** Indicar histeroscopia cirúrgica com alça monopolar em ambiente hospitalar devido ao risco de malignidade.

---

### Questão 55

SESAPI | PI | 2026

Casal procura avaliação após 18 meses de infertilidade. A paciente de 32 anos tem história de DIP tratada há 3 anos. A histerossalpingografia mostra obstrução bilateral distal com hidrossalpinge moderada. Considerando as melhores práticas para reprodução assistida, qual a conduta mais adequada?

- A)** Indução de ovulação com coito programado por 6 meses
- B)** Laparoscopia para destamponamento tubário e tentativa de gravidez espontânea
- C)** Fertilização in vitro (FIV) após salpingectomia bilateral prévia
- D)** FIV sem intervenção cirúrgica, pois a hidrossalpinge não interfere na implantação
- E)** Inseminação intrauterina por 3 ciclos antes de FIV

---

### Questão 56

SESAPI | PI | 2026

Mulher de 39 anos, G2P2, com anemia ferropriva e sangramento uterino anormal há 1 ano, apresenta mioma submucoso FIGO tipo 1 de 2,5 cm. Deseja manter fertilidade. Qual é a

melhor abordagem terapêutica?

- A) Miomectomia por laparotomia
- B) Embolização das artérias uterinas
- C) Miomectomia histeroscópica em estágio único
- D) Histerectomia total, por ser mioma sintomático
- E) Tratamento com análogo de GnRH por 6 meses como terapia definitiva

---

### Questão 57

SESAPI | PI | 2026

Paciente de 27 anos apresenta corrimento mucopurulento e sangramento pós-coito. Testes para *Chlamydia trachomatis* e *Neisseria gonorrhoeae* (PCR) são negativos após tratamento empírico prévio. Persistindo sintomas, qual agente deve ser considerado e qual a terapêutica?

- A) *Mycoplasma genitalium* — Azitromicina dose única
- B) *Ureaplasma urealyticum* — Penicilina benzatina
- C) *Haemophilus ducreyi* — Ceftriaxona intramuscular
- D) *Mycoplasma genitalium* — Esquema com moxifloxacino
- E) *Trichomonas vaginalis* — Metronidazol dose única

---

### Questão 58

SESAPI | PI | 2026

Uma paciente de 44 anos, G1P1, apresenta sangramento uterino anormal há 9 meses, associado a irregularidade menstrual. Não usa TRH. A USG transvaginal mostra endométrio de 14 mm, heterogêneo, com imagem focal de 1,8 cm com fluxo ao Doppler. É realizada histeroscopia diagnóstica, que evidencia lesão polipoide pediculada, com área focal esbranquiçada e irregular na base, sugerindo atipia. Durante o exame há boa visibilidade e estabilidade hemodinâmica. Considerando boas práticas e segurança oncológica, qual é a melhor conduta imediata?

- A) Realizar polipectomia histeroscópica completa ambulatorial
- B) Realizar apenas biópsia dirigida e programar ressecção posterior em centro cirúrgico
- C) Interromper o exame e solicitar histeroscopia cirúrgica com alça monopolar
- D) Iniciar progestagênio contínuo até realização de nova histeroscopia
- E) Realizar curetagem uterina após o exame para complemento diagnóstico

---

### Questão 59

SESAPI | PI | 2026

Mulher de 39 anos, com mamas extremamente densas (categoria D), sem antecedentes familiares. Na USG mamária, observa-se nódulo irregular hipoeicoico, não paralelo, margens anguladas e presença de sombra acústica posterior no quadrante superomedial da mama esquerda. Mamografia é inconclusiva devido à densidade mamária. Qual a classificação BI-RADS e conduta adequada?

- A) BI-RADS 3 — Seguimento em 6 meses

- B)** BI-RADS 4A — Biópsia por core biopsy
- C)** BI-RADS 4C — Biópsia por core biopsy
- D)** BI-RADS 5 — Biópsia imediata e preparo para abordagem cirúrgica
- E)** BI-RADS 0 — Repetir mamografia com incidências adicionais

### Questão 60

SESAPI | PI | 2026

Casal tenta engravidar há 2 anos. Mulher 34 anos, ciclos regulares, reserva ovariana com AMH (Hormônio Anti-Mülleriano)= 0,7 ng/mL e AFC (Contagem de Folículos Antrais)= 4. Histerossalpingografia normal. Espermograma normal. Paciente deseja tentativa rápida devido ao tempo de infertilidade. Qual conduta inicial é mais apropriada?

- A)** Coito programado por 6 meses
- B)** Indução de ovulação leve com letrozol associada à inseminação intrauterina
- C)** Fertilização in vitro, considerando idade e baixa reserva ovariana
- D)** Histeroscopia diagnóstica antes de qualquer tratamento
- E)** Estimulação ovariana com gonadotrofinas sem reprodução assistida

### Questão 61

SESAPI | PI | 2026

André, 3 anos de idade, há 4 dias apresenta febre 38°C, associada a tosse + anorexia + dor abdominal, com boa diurese e evacuações ausentes nas últimas 24h. Chega ao Pronto Socorro em bom estado geral, corada, hidratada, FR = 42 ipm, FC = 114 bpm, Sat O<sub>2</sub> = 94%, T 37,8°C. Na ausculta pulmonar há diminuição do murmúrio vesicular em base esquerda, com estertores esparsos, sem sibilos. Fez radiografia de tórax tem consolidação em lobo inferior esquerda, sem acometimento pleural. A conduta mais indicada ao quadro apresentado é:

- A)** internação hospitalar e administração de penicilina cristalina e gentamicina.
- B)** internação hospitalar e administração de oxacilina.
- C)** internação hospitalar e administração de ceftriaxona e claritromicina.
- D)** prescrição de ceftriaxona IM a ser realizada diariamente no serviço de saúde.
- E)** prescrição de amoxicilina VO e reavaliação em 72h

### Questão 62

SESAPI | PI | 2026

João, 5 meses e 3 sem, em amamentação exclusiva, trazido para consulta de puericultura, sem queixas. Mãe só está preocupada pois irá voltar a trabalhar a partir da próxima semana e queria orientações sobre como progredir a transição alimentar a partir desse período. A criança pesa 6 Kg e tem desenvolvimento adequado. Qual seria a orientação mais adequada para a mãe com relação a alimentação de seu filho?

- A)** iniciar suco de fruta natural, sem açúcar, 1x /dia pela manhã e fruta amassada ou raspada à tarde. Após 1 semana, iniciar papa principal no horário de almoço
- B)** iniciar suco de fruta natural, sem açúcar, 1x /dia pela manhã e fruta amassada ou

raspada à tarde. Após 1 semana, iniciar papa principal (mistura múltipla) no horário de almoço e jantar

- C)** iniciar fruta 2x/dia e após 1 sem, iniciar papa principal (mistura múltipla) no almoço ou jantar
- D)** iniciar fórmula infantil diluindo 5 medidas para 100ml de água filtrada e após 1 sem iniciar fruta 1x/dia
- E)** iniciar fórmula infantil diluindo 5 medidas para 100ml de água filtrada e após 1 sem iniciar papa principal (mistura múltipla) 1x/dia

---

### Questão 63

SESAPI | PI | 2026

Marta, 4 anos de idade, previamente hígida, chegou ao pronto atendimento com relato de “coceira na garganta”, rouquidão, vômitos (2 episódios) e dor abdominal há cerca de 1 hora atrás, após ingerir sorvete com amendoim. Ao exame, está em regular estado geral, FC: 130 bpm, FR: 30 ipm, saturação ao oxímetro de pulso de 95% em ar ambiente, PA: 100 x 60 mmHg. Sibilos pulmonares bilateralmente, sem retrações torácicas. Bulhas rítmicas normofonéticas e sem sopros. Abdome flácido, sem visceromegalias. Pele: sem lesões. Qual a medicação mais adequada para esse caso?

- A)** Epinefrina subcutânea.
- B)** Prednisolona oral.
- C)** Epinefrina intramuscular
- D)** Oxigênio inalatório
- E)** Dexclorfeniramina oral

---

### Questão 64

SESAPI | PI | 2026

Os efeitos do aleitamento materno sobre a saúde da criança e da mulher que amamenta tem superioridade comprovada sobre outras formas de alimentar a criança pequena. Sobre os benefícios desse aleitamento materno, podemos dizer, exceto:

- A)** Reduz a mortalidade infantil por causas preveníveis em 13%, considerando crianças menores de 5 anos
- B)** Reduz a incidência e gravidade da diarreia
- C)** Melhora nutrição infantil, tanto que o crescimento da criança amamentada é a referência utilizada nas curvas de crescimento da OMS
- D)** Protege a mãe que amamenta contra câncer de ovário, de mama e de trato digestório, além de efeito anticoncepcional
- E)** Melhora o desenvolvimento cognitivo e inteligência

---

### Questão 65

SESAPI | PI | 2026

O cenário da sífilis congênita hoje no Brasil é de crescimento e muita preocupação, apesar das metas de eliminação, com elevadas taxas de incidência em algumas regiões por falhas no

pré natal, seja no diagnóstico ou tratamento da doença. Maria fez pré natal irregular, tomou apenas polivitamínico durante gestação, e no momento do parto, fez VDRL com titulação positiva. Qual a melhor conduta em relação ao recém-nascido?

- A) Fazer VDRL e só iniciar tratamento se titulação do Rn for 4x maior do que a da mãe
- B) Iniciar penicilina cristalina independente do valor do VDRL do Rn e manter por 10 dias
- C) Se o VDRL do Rn for negativo, sem alterações clínicas, radiológicas, hematológicas ou líquóricas, aplicar penicilina benzatina em dose única intramuscular
- D) A coleta do líquor só deverá ser realizada somente se houver sinais ou sintomas neurológicos
- E) Se o VDRL do Rn for negativo, não deverá ser feita nenhuma intervenção além de encaminhamento para seguimento ambulatorial.

---

### Questão 66

SESAPI | PI | 2026

Recém-nascido de mãe primigesta, nasceu de parto vaginal com 37sem de idade gestacional, peso de 2750g, Apgar 9/10. Mãe nega intercorrências na gestação. Com 48 horas de vida, mãe observou icterícia no Rn e retornou a maternidade, sendo avaliado como icterício Zona I de Kramer. Em aleitamento materno exclusivo, sem outras queixas. Qual a melhor conduta para o caso?

- A) Internar para melhor avaliação e fazer coleta seriada de bilirrubina
- B) Pesquisar sobre tipagem sanguínea dos pais e se não houver risco para incompatibilidade sanguínea entre mãe e filho, liberar Rn para seguimento ambulatorial, com retorno em 72h para reavaliação
- C) Pedir US de abdômen para avaliar causas de colestase
- D) Internar e iniciar fototerapia devido elevado risco de doença hemolítica grave
- E) Pedir sorologias TORCHS para adequado diagnóstico diferencial

---

### Questão 67

SESAPI | PI | 2026

Jônatas, 1 ano e 2 meses de idade, levado pela mãe à consulta de puericultura, sem queixas, para atualização do cartão vacinal. Mãe refere que as vacinas estavam atualizadas até quando a criança iniciou na creche, há 4 meses. Desde então, devido a quadros gripais -sic, recorrentes, não levou mais para tomar vacinas. No momento está bem. Qual deve ser o plano de atualização vacinal para essa criança?

- A) fazer a primeira dose de vacina anti-COVID e primeira dose de Febre Amarela
- B) fazer os reforços de Penta e Pneumo 10
- C) Fazer somente vacina da Febre amarela
- D) Fazer reforços de Pneumo 10, Meningo ACWY e tríplice viral
- E) não precisa fazer vacinas agora, pois as próximas serão apenas com 1a 3mese

---

### Questão 68

SESAPI | PI | 2026

Para a avaliação da adiposidade na infância e adolescência, utilizamos curvas de IMC ajustado para o sexo e a idade. Quando o IMC do paciente foi assinalado na curva adotada pelo Ministério da Saúde, notamos que o paciente encontra-se na categoria de obesidade. Isso ocorre porque (assinale a correta):

- A)** Usamos a curva do CDC e o percentil é  $> p.85$
- B)** Usamos a curva do CDC e o percentil é  $> p.95$
- C)** Usamos a curva do CDC e o percentil é  $> p.97$
- D)** Usamos a curva da OMS e o escore Z-IMC é  $> +1$
- E)** Usamos a curva da OMS e o escore Z-IMC é  $> +2$

---

### Questão 69

SESAPI | PI | 2026

As causas monogênicas de obesidade são mais raras, mas devem ser lembradas como diagnóstico diferencial. Em que situações devemos pensar em investigar obesidade monogênica?

- A)** Obesidade associada à puberdade antecipada em meninas
- B)** Obesidade precoce e grave associada a atraso do desenvolvimento neuropsicomotor
- C)** Obesidade de início tardio associada à alta estatura
- D)** Associação com resistência à insulina, alta estatura e síndrome de ovários policísticos
- E)** Obesidade associada ao histórico familiar forte e alimentação com dieta rica em ultraprocessados desde a introdução alimentar

---

### Questão 70

SESAPI | PI | 2026

O kwashiorkor é uma forma grave de desnutrição proteico-energética caracterizada principalmente pela deficiência de proteínas na dieta, apesar da ingestão calórica muitas vezes ser adequada. Essa condição ocorre com maior frequência em crianças em idade pré-escolar, especialmente em regiões onde a oferta de proteínas de alto valor biológico é limitada. Os principais sinais clínicos incluem:

- A)** Edema, atrofia muscular e ausência de gordura subcutânea.
- B)** Hipoalbuminemia, edema e esteatose hepática.
- C)** Hiperalbuminemia, lesões de pele e esteatose hepática.
- D)** Hipoalbuminemia, ausência de gordura subcutânea e alterações de cabelo.
- E)** Hiperalbuminemia, edema e esteatose hepática.

---

### Questão 71

SESAPI | PI | 2026

Aponte dentre os nutrientes abaixo aquele que é essencial para fortalecer o sistema imunológico e ajudar a manter a barreira intestinal saudável, principalmente em casos de desnutrição.

- A)** Ferro

- B)** Vitamina A
- C)** Magnésio
- D)** Zinco
- E)** Vitamina D

---

### Questão 72

SESAPI | PI | 2026

Paciente com 6 anos de idade encaminhado ao ambulatório do HILP por apresentar alterações de exames laboratoriais feitos na rotina. Apresenta colesterol total (CT) de 203 mg/dL, HDL-c: 63 mg/dL; LDL-c: 129 mg/dL; triglicérides: 54 mg/dL. Ao exame físico, paciente sem alterações, estatura no Z-estatura 0 e Z IMC +0,5 DP. Tem história familiar positiva para doença cardiovascular (avós paternos). Sobre esse caso, assinale a alternativa correta:

- A)** Trata-se de hipercolesterolemia familiar heterozigótica, entraria com colestiramina por causa da idade cronológica.
- B)** Os valores estão dentro do normal para idade, portanto, não tem indicação de tratamento.
- C)** Como tem história positiva para doença cardiovascular, medicaria com estatina.
- D)** Orientaria apenas dieta, com ingestão de gordura saturada de até 7% do valor calórico total.
- E)** Trata-se de hipercolesterolemia familiar homozigótica, portanto, paciente com indicação de tratamento medicamentoso com estatina

---

### Questão 73

SESAPI | PI | 2026

Mãe levou menina de 6 anos de idade ao Pronto Atendimento Infantil com história de há 4 dias febre alta e odinofagia, evoluindo há 24h com manchas pelo corpo. Ao exame físico: EGR, exantema micropapular difuso, áspero, sobretudo em face e tronco, com acentuação em dobras cutâneas e palidez perioral. Orofaringe: hiperemia com petéquias em palato e "língua em framboesa". Linfonodos cervicais palpáveis, moveis, dolorosos a palpação, os maiores de 1,5cm. Eupneico, ausculta cardiopulmonar fisiológica e abdômen: sem visceromegalia. Cartão vacinal: sem informações. Qual o diagnóstico mais provável desse paciente?

- A)** Doença de Kawasaki
- B)** Sarampo
- C)** Escarlatina
- D)** Rubéola
- E)** Exantema infeccioso

---

### Questão 74

SESAPI | PI | 2026

Dentre as causas secundárias de aumento de colesterol total, podemos citar, exceto:

- A)** Hipotireoidismo

- B) Doença renal crônica
- C) Doença hepática
- D) Doença de estoque do glicogênio tipo 1
- E) Doença osteo-metabólica da prematuridade

---

### Questão 75

SESAPI | PI | 2026

Paulo, 3 anos de idade, apresenta há cerca de 3 semanas quadro de edema facial que progrediu para abdômen e membros inferiores, associados a oligúria e, há 3d, apresenta coriza e tosse leves. Nega febre ou vômitos. Refere ainda anorexia e evacuações pastosas. Ao exame físico: EGR, anasarca (2,5kg acima do peso seco), PA: 80/50 mmHg, leve taquipneia. Ausculta cardiopulmonar: sem alterações além de redução do murmúrio vesicular em bases pulmonares. Abdomen: globoso, piparote positivo. Qual alteração laboratorial é mais compatível com a hipótese diagnóstica mais provável para esse caso?

- A) Proteinúria
- B) Uremia
- C) Plaquetopenia
- D) Coagulopatia
- E) Hipocomplementenemia

---

### Questão 76

SESAPI | PI | 2026

Beatriz, 3 anos de idade, foi levada ao Pronto Atendimento Infantil com relato de diarreia aquosa (4 episódios/d) há três dias, associada a dois picos febris no primeiro dia e vômitos (2x) no dia do atendimento. Mãe refere que criança está ativa, porém tem recusado alimentos sólidos (só toma leite), com ingesta hídrica satisfatória, mantendo boa diurese. Diante desse cenário clínico, qual seria a melhor abordagem terapêutica para essa paciente?

- A) Iniciar hidratação venosa, antibioticoterapia empírica e antiparasitário
- B) Administrar medicamentos antidiarreicos (antissecrtores) para reduzir o número de evacuações e a criança não ter prejuízo no sono.
- C) Indicar reidratação oral com solução de sais de reidratação oral (SRO), e administrar zinco uma vez ao dia, durante 10 a 14 dias (até os 6 meses de idade 10mg/dia e em maiores de 6 meses até os 5 anos de idade 20mg/dia) e considerar o uso de probióticos para auxiliar na restauração da microbiota intestinal.
- D) Indicar reidratação oral com solução de sais de reidratação oral (SRO), antibioticoterapia via oral e administrar zinco uma vez ao dia, durante 10 a 14 dias (até os 6 meses de idade 10mg/dia e em maiores de 6 meses até os 5 anos de idade 20mg/dia)
- E) Manter apenas observação clínica, pois a criança apresenta bom estado geral e a diarreia aguda viral tem resolução espontânea, sem necessidade de medidas terapêuticas.

---

### Questão 77

SESAPI | PI | 2026

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que mais da metade das crianças do mundo, cerca de 1 bilhão, sofram alguma forma de violência. Segundo dados epidemiológicos mundiais e brasileiros, os casos de violência contra crianças e adolescentes aumentaram de modo significativo, especialmente no contexto da Pandemia da COVID-19. Assinale a alternativa incorreta:

- A)** O primeiro passo para cuidado de crianças e adolescentes vítimas de violência é o acolhimento, tendo ciência de que esse menor pode se encontrar em estado de grande ansiedade ou medo, sobretudo em situações de violência crônica.
- B)** Os serviços de saúde devem esgotar todos os recursos para oferecer os cuidados e a proteção de crianças, adolescentes e sua famílias em situação de violência
- C)** A participação e o apoio de equipes multiprofissionais na abordagem dos casos de violência contra crianças e adolescentes pode ajudar a encontrar evidências de traumas que vão além de lesões físicas
- D)** A violência sexual é a forma mais prevalente de violência em nosso meio, seguida pela física e pela negligência
- E)** Cyberbullying é um termo da língua inglesa utilizado para caracterizar a prática agressiva de intimidações e de perseguições no ambiente virtual, sendo um tipo de violência extrafamiliar crescente em nosso meio, com o acesso cada vez maior ao mundo virtual.

---

### Questão 78

SESAPI | PI | 2026

Alice, 11 meses, foi levada ao Pronto Atendimento Infantil com história de sonolência e vômitos hoje após boneco ter batido em sua cabeça. No Pronto Atendimento Infantil, foi realizada TC de crânio que evidenciou hematomas subdurais bilaterais em diferentes fases de evolução. Além dessas lesões intracranianas, foram vistas hemorragias retinianas bilaterais ao exame de fundo de olho. Sobre a principal hipótese diagnóstica para o quadro descrito, é incorreto afirmar que:

- A)** Fratura de arco posterior da costela, reforça o diagnóstico da síndrome acima
- B)** Fraturas de ossos longos são achados muito comuns, típicos da síndrome em questão
- C)** Cerca de um terço das crianças pequenas que apresentam quadro clínico similar ao descrito acima morrem rapidamente. As que sobrevivem podem apresentar importantes sequelas neurológicas
- D)** Lesões esqueléticas aparecem em até 50% dos casos, mas sua presença não é requerida para o diagnóstico
- E)** O mecanismo de trauma descrito é incompatível com o quadro clínico apresentado

---

### Questão 79

SESAPI | PI | 2026

José, 8 anos, levado por sua mãe ao Pronto Atendimento Infantil com relato de edema nos olhos há 1 sem, evoluindo com edema em abdômen e membros inferiores associada a urina escura - cor de "coca-cola". Nega sintomas gripais no momento, mas 10 dias antes do início do edema teve infecção de garganta. PA:130/90. Qual o principal exame laboratorial para confirmar o diagnóstico e qual o tratamento inicial indicado?

- A) ASLO; restrição hidrossalina + diurético de alça + monitorização de peso, PA e diurese
- B) Creatinina sérica; restrição hidrossalina e corticoide
- C) Anti-DNA (Nativo); restrição hidrossalina +diurético de alça
- D) Complemento sérico; antiparasitário + corticoide
- E) Proteinúria; albumina intravenosa

---

### Questão 80

SESAPI | PI | 2026

Ester, 2anos e 6 meses, foi encontrada “desmaiada” por sua mãe e com respiração irregular . A médica da urgência identificou ainda cianose, hiporreflexia e hipotensão. A mãe disse que ao lado da criança tinha uma cartela vazia de medicação que usava para dormir rotineiramente. Relacione o nome da toxíndrome e a provável medicação ingerida por Ester.

- A) Narcótica; codeína
- B) Depressiva; benzodiazepínico
- C) Extrapiramidal; haloperidol
- D) Anticolinérgica; atropina
- E) Simpatomimética; anfetamina

---

### Questão 81

SESAPI | PI | 2026

De acordo com a Lei Federal nº 8.080/1990, a descentralização é um dos princípios organizativos do SUS. Esse conceito refere-se à:

- A) Concentração do poder de decisão no Ministério da Saúde para garantir a unidade nacional.
- B) Distribuição de competências entre as esferas de governo, com ênfase na municipalização dos serviços.
- C) Organização dos serviços em níveis de complexidade crescente (primária, secundária e terciária).
- D) Garantia de que todos os cidadãos tenham acesso aos mesmos serviços, independentemente da região.
- E) Integração das ações de saneamento básico e saúde ambiental sob gestão exclusiva do estado.

---

### Questão 82

SESAPI | PI | 2026

A Lei nº 8.142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Sobre as Conferências de Saúde, é correto afirmar que:

- A) Devem reunir-se a cada dois anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes.
- B) São órgãos permanentes e deliberativos que fiscalizam a movimentação financeira.
- C) Possuem representação paritária, sendo 50% de representantes dos usuários e 50% dos demais segmentos.

- D)** Têm caráter consultivo, não podendo influenciar na elaboração dos planos de saúde.
  - E)** Devem reunir-se a cada quatro anos com representação dos vários segmentos sociais.
- 

### Questão 83

SESAPI | PI | 2026

O Pacto pela Saúde (2006) introduziu dimensões para aperfeiçoar o SUS. Qual das alternativas abaixo apresenta as três dimensões que compõem esse pacto?

- A)** Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão.
  - B)** Pacto de Atenção Básica, Pacto Hospitalar e Pacto de Urgência.
  - C)** Pacto Financeiro, Pacto Político e Pacto de Regionalização.
  - D)** Pacto pela Humanização, Pacto pela Ética e Pacto pela Universalidade.
  - E)** Pacto de Financiamento, Pacto pela Equidade e Pacto de Controle Social.
- 

### Questão 84

SESAPI | PI | 2026

O conceito de Equidade, embora não esteja explicitamente escrito no texto da Constituição de 1988 como termo, é um princípio doutrinário do SUS que significa:

- A)** Oferecer exatamente o mesmo tratamento a todos os cidadãos, sem distinções.
  - B)** Priorizar o atendimento em áreas urbanas em detrimento das áreas rurais.
  - C)** Tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.
  - D)** Garantir que apenas trabalhadores contribuintes tenham acesso à alta complexidade.
  - E)** Reduzir o investimento em saúde preventiva para focar em transplantes e oncologia.
- 

### Questão 85

SESAPI | PI | 2026

O preenchimento da Declaração de Óbito (DO) é um ato médico de grande importância estatística e jurídica. Sobre a responsabilidade e o fluxo de emissão desse documento, assinale a alternativa correta:

- A)** Em caso de morte por causas externas (homicídio, suicídio ou acidente), a DO deve ser fornecida pelo médico assistente que prestou o último atendimento no hospital.
  - B)** Em mortes naturais ocorridas em domicílio, sem assistência médica prévia, a DO deverá ser obrigatoriamente emitida pelo serviço de verificação de óbitos (SVO), onde houver, ou pelo médico do serviço público de saúde local.
  - C)** O médico está autorizado a cobrar honorários específicos para a emissão da DO, uma vez que se trata de um documento com fé pública e responsabilidade civil.
  - D)** No óbito fetal, a emissão da DO é facultativa, independentemente do tempo de gestação ou peso do feto, devendo ser feita apenas se a família desejar realizar o sepultamento.
  - E)** Nos casos de morte natural em hospitais onde não há SVO, a DO deve ser assinada pelo médico do IML (Instituto Médico Legal) para garantir a isenção de crime.
-

### Questão 86

SESAPI | PI | 2026

Um pesquisador deseja investigar a associação entre o uso prolongado de fones de ouvido e a perda auditiva precoce. Ele seleciona um grupo de 500 jovens com diagnóstico de perda auditiva e 500 jovens sem a patologia. Em seguida, aplica um questionário para investigar a exposição prévia aos fones de ouvido nos últimos 5 anos. Este desenho de estudo é classificado como:

- A) Estudo de Coorte, pois parte da exposição para o desfecho.
- B) Estudo Transversal, pois analisa a prevalência no momento atual.
- C) Estudo de Caso-Controle, pois parte do desfecho (doentes) para investigar a exposição passada.
- D) Ensaio Clínico Randomizado, por haver um grupo controle.
- E) Estudo Ecológico, pois analisa o comportamento de grupos populacionais e não indivíduos.

### Questão 87

SESAPI | PI | 2026

Em um estudo de Coorte realizado para avaliar o risco de infarto agudo do miocárdio (IAM) em indivíduos sedentários, os pesquisadores encontraram um Risco Relativo (RR) de 2,5. A interpretação correta desse resultado é:

- A) Indivíduos sedentários têm 2,5% de chance de ter um IAM.
- B) O sedentarismo é um fator de proteção, reduzindo o risco em 2,5 vezes.
- C) Indivíduos sedentários apresentam um risco 150% maior (ou 2,5 vezes maior) de desenvolver IAM do que os ativos.
- D) A incidência de IAM é a mesma entre expostos e não expostos, com erro amostral de 2,5.
- E) O estudo é inválido, pois o Risco Relativo só pode ser calculado em estudos de Caso Controle.

### Questão 88

SESAPI | PI | 2026

Sobre a terminalidade da vida e os cuidados paliativos, o Código de Ética Médica (CEM) estabelece limites claros para a atuação profissional. De acordo com a norma vigente, é vedado ao médico:

- A) Prescrever sedação paliativa quando o sofrimento do paciente for considerado refratário às medidas convencionais.
- B) A prática da ortotanásia (morte no tempo certo), garantindo os cuidados de conforto em casos de doença incurável e terminal.
- C) Abreviar a vida do paciente (eutanásia), ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.
- D) Suspender ou limitar tratamentos fúteis ou obstinados (distanásia) que apenas prolonguem o sofrimento do paciente, sem benefício terapêutico.
- E) Oferecer cuidados paliativos sem o consentimento prévio do comitê de ética hospitalar

em casos de pacientes inconscientes.

---

### Questão 89

SESAPI | PI | 2026

Sobre os Ensaios Clínicos Randomizados (ECR), qual das características abaixo é fundamental para garantir que os grupos de intervenção e controle sejam comparáveis, minimizando o viés de seleção e fatores de confusão?

- A) Placebo.
- B) Mascaramento (Cegamento).
- C) Randomização (Alocação aleatória).
- D) Longo tempo de acompanhamento.
- E) Análise de regressão logística pós-estudo.

---

### Questão 90

SESAPI | PI | 2026

Um teste diagnóstico apresenta alta sensibilidade. Qual é a principal característica clínica desse teste quando aplicado em uma população?

- A) Possui poucos resultados falso-positivos.
- B) Um resultado negativo tem grande poder para excluir a doença (alto valor preditivo negativo).
- C) Tem um alto valor preditivo positivo, independentemente da prevalência.
- D) É excelente para confirmar o diagnóstico em pacientes com suspeita clínica elevada.
- E) Garante que o teste seja altamente específico, reduzindo a necessidade de exames confirmatórios.

---

### Questão 91

SESAPI | PI | 2026

A Vigilância Sanitária (VISA) e a Vigilância Epidemiológica (VE) possuem campos de atuação distintos, porém complementares. De acordo com a Lei nº 8.080/90, é competência exclusiva da Vigilância Sanitária:

- A) O controle de doenças transmissíveis e a investigação de surtos hospitalares.
- B) A execução de ações que visam eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde decorrentes do meio ambiente e da produção e circulação de bens.
- C) A busca ativa de casos de doenças exantemáticas em creches e escolas.
- D) A análise do perfil demográfico e epidemiológico de uma população para o planejamento de saúde.
- E) A coordenação do Programa Nacional de Imunizações (PNI) em âmbito municipal.

---

### Questão 92

SESAPI | PI | 2026

Sobre a Notificação Compulsória de doenças e agravos, qual das alternativas abaixo apresenta uma situação que exige notificação imediata (em até 24 horas) às autoridades de saúde por parte do profissional assistente?

- A)** Casos suspeitos de Dengue em áreas endêmicas sem sinais de alarme.
- B)** Diagnóstico de Hanseníase em adultos.
- C)** Suspeita de Febre Amarela ou de um evento adverso grave pós-vacinação.
- D)** Casos confirmados de Sífilis em gestantes.
- E)** Diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1 em crianças menores de 5 anos.

---

### Questão 93

SESAPI | PI | 2026

Durante o período de chuvas, uma pequena cidade observou a ocorrência de 15 casos de Leptospirose em um único bairro onde, historicamente, ocorria apenas 1 caso por ano. Esse aumento repentino de casos, restrito a uma área geográfica delimitada e com nexos causal comum, é tecnicamente classificado como:

- A)** Endemia.
- B)** Pandemia.
- C)** Surto.
- D)** Holoendemia.
- E)** Erradicação.

---

### Questão 94

SESAPI | PI | 2026

Um médico atende um paciente de 17 anos que solicita rastreio para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), mas solicita expressamente que seus pais ou responsáveis não sejam informados sobre a consulta ou os resultados. De acordo com o Código de Ética Médica vigente, qual deve ser a conduta do médico?

- A)** Informar os pais obrigatoriamente, uma vez que o paciente é menor de idade e a quebra de sigilo é um dever legal para proteção do incapaz.
- B)** Manter o sigilo e realizar os exames, desde que o adolescente tenha capacidade de discernimento para compreender sua saúde e as orientações fornecidas.
- C)** Realizar o atendimento, mas condicionar a entrega dos resultados à presença de um responsável legal, visando garantir a adesão ao tratamento.
- D)** Quebrar o sigilo profissional apenas se os resultados dos exames forem positivos para patologias de notificação compulsória, como HIV ou Sífilis.
- E)** Comunicar o fato aos responsáveis apenas se houver risco iminente de morte ou dano grave à saúde do paciente, independentemente de sua capacidade de compreensão.

---

### Questão 95

SESAPI | PI | 2026

A Vigilância em Saúde do Trabalhador é um dos componentes da Vigilância em Saúde. Entre suas ações prioritárias, destaca-se a investigação de acidentes de trabalho. Sobre o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), é correto afirmar que:

- A)** Serve para punir o trabalhador que se acidenta por negligência individual.
- B)** Estabelece a relação entre a doença ou lesão e a atividade econômica da empresa para fins de benefícios e prevenção.
- C)** É aplicado apenas em funcionários públicos estatutários, não atingindo o setor privado.
- D)** Isenta a empresa de qualquer responsabilidade civil após o diagnóstico da doença ocupacional.
- E)** Define que toda doença crônica de um trabalhador tem origem exclusivamente laboral.

---

### Questão 96

SESAPI | PI | 2026

Em relação à Malária, como deve ser feita a notificação fora da região amazônica?

- A)** Notificação imediata apenas se o paciente for estrangeiro.
- B)** Notificação semanal, assim como dentro da região amazônica.
- C)** Não há necessidade de notificação fora da região amazônica.
- D)** Notificação imediata (em até 24 horas).
- E)** Notificação apenas após confirmação por teste molecular (PCR).

---

### Questão 97

SESAPI | PI | 2026

Uma mulher de 40 anos realiza uma mamografia de rastreamento, que identifica um nódulo suspeito. Após biópsia, é diagnosticado um carcinoma in situ, e a paciente é encaminhada para tratamento cirúrgico imediato. O rastreamento populacional através de exames em indivíduos assintomáticos visa o diagnóstico precoce e é um exemplo de:

- A)** Prevenção Primária.
- B)** Prevenção Secundária.
- C)** Prevenção Terciária.
- D)** Prevenção Quaternária.
- E)** Promoção da saúde.

---

### Questão 98

SESAPI | PI | 2026

No contexto da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) e das diretrizes da Carta de Ottawa, a promoção da saúde de grupos populacionais específicos (como idosos, populações ribeirinhas ou quilombolas) deve basear-se em ações que transcendam a prevenção de doenças. Qual estratégia é considerada fundamental para a eficácia dessas ações junto a esses grupos?

- A)** Foco exclusivo na mudança de hábitos individuais deletérios, como o tabagismo e o sedentarismo, por meio de palestras educativas verticais.

- B)** Transferência da responsabilidade total do cuidado à saúde para o indivíduo, desonerando o Estado de intervir nos determinantes sociais.
- C)** Priorização de intervenções biomédicas de alta complexidade para garantir a cura de patologias prevalentes nesses grupos específicos.
- D)** Fomento ao empoderamento (empowerment) comunitário, visando aumentar a autonomia e o controle dos sujeitos sobre os determinantes sociais de sua saúde.
- E)** Padronização de protocolos assistenciais idênticos para todos os grupos, independentemente das particularidades culturais ou regionais, para garantir a equidade.

---

### Questão 99

SESAPI | PI | 2026

O conceito de Prevenção Quaternária (P4), introduzido por Marc Jamouille e muito relevante na Medicina de Família e Comunidade, define-se como a ação feita para:

- A)** Identificar pacientes em risco de doenças genéticas raras.
- B)** Promover vacinação em massa em áreas de surto.
- C)** Detectar e evitar o excesso de intervencionismo médico e a iatrogenia (danos desnecessários).
- D)** Reabilitar pacientes com doenças crônicas terminais.
- E)** Fornecer cuidados paliativos exclusivos no ambiente hospitalar.

---

### Questão 100

SESAPI | PI | 2026

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que, em seu capítulo I, versa a respeito dos objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que o SUS:

- A)** Estabelece parcerias com a iniciativa privada para ações ligadas ao saneamento básico.
- B)** Delega às instituições de ensino superior a ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde.
- C)** Atribui exclusivamente aos municípios a vigilância de portos, aeroportos e fronteiras.
- D)** Deve desempenhar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- E)** Define os estados como formuladores e executores das políticas de sangue e hemoderivados.